

適合 冷凍 外銷 加工 製罐 的：

豆·豌豆

——傑俊丁——

年來本省冷凍事業發達，軟莢豌豆又為冷凍外銷的主要菜種。硬莢豌豆是以子實供食用或加工製罐，所以又叫做加工豌豆。下面將本省目前主要軟硬莢豌豆的品種和栽培方法介紹，以供各位參考。

軟莢適冷凍

(1) 臺中九號：本品種由臺中區農業改良場育成，花呈紫紅色，雙花，莢長一百五十至一百八十公分，葉黃綠色。莢長六至八公分，寬一。五公分，成熟乾燥後種子呈暗紫色。種皮有皺紋，種子千粒重一百六十二公克，每公頃嫩莢產量約七千至七千五百公克。青豆產量二千至二千八百公克，乾種產量約一千至一千五百公克，為目前冷凍莢豌豆的主要原料。

(2) 在來白花：本品種為本省栽培最普遍的品種，花呈白色，雙花，莢長一百至一百五十公分。葉稍濃綠色，莢長六。五至七公分，寬一至一。三公分，產量較臺中九號為差。

(3) 網莢豌豆：花呈白色，莢形小，葉呈黃綠色，品質尚可。

硬莢可製罐

硬莢豌豆是加工製罐的主要原料。近年來本省蔬菜加工製罐事業發達，所以臺中區農業改良場於民國五十二年由美國引進硬莢豌豆等十餘品種，經數年栽植及製罐試驗結果，以「百富」(Perfection)及「罐王」(Canner King)二品種優良，產量高，並適於加工製罐。品種特性如下：

(1) 百富：葉色濃綠，雙花，花色白。始花期莢長三八。五公分，莢寬一。三公分，莢長六。七公分，青豆千粒重四百零四公克。青豆剝實率四八%，種子千粒重一百六十公克。採收所需日數一百一十五至一百三十九天，每公頃青豆平均產量二千七百八十公克。

(2) 罐王：葉色濃綠，雙花，花色白，始花期莢長三四。一公分，莢寬一。五公分，莢長七。七公分。青豆千粒重五百九十五公克，青豆剝實率五〇%，種子千粒重二百二十四公克。採收所需日數一百一十五至一百三十九天，每公頃青豆平均產量二千六百九十九公克。

中部秋冬栽培

豌豆性喜冷涼氣候，攝氏十五至二十度的氣溫最適豌豆生長。幼苗能耐攝氏四至七度的低溫，但生育期間氣溫在攝氏五度時結莢情形就不好。氣溫如超過攝氏二十度以上，則發育緩慢，甚至枯萎。

豌豆在生育初期需要適當水份，但在莢實成熟時，以稍乾燥為宜。本省中部地區秋冬季最適豌豆生長，如整個生育期在攝氏二十度以下

裕台農藥



50% 特製甲基巴拉松乳劑 農藥字〇四二〇號

50% 甲基獨一乳劑 農藥字一三〇四號

50% 乙基飛快殺乳劑 農藥字一一六〇號

50% 飛滅水和劑 農藥字〇四二二號

50% 加保利水和劑 農藥字一三八七號

■ 特製3% BHC粉劑 農藥字一三九八號

—— 堂堂推出 ——

新銳！

特效！

現貨彰化供應處

信東農藥行

彰化縣員林鎮中山路十號之六

電話一一六二號

裕台企業股份有限公司農業工業廠

廠址：彰化市中華路一六二號 電話：四四〇三
總公司：台北市衡陽路十六號

，則溫度越高，發育越快；也就是說，中部十月中旬以後的氣候，最適豌豆生長。

土壤以含有機質，排水良好的砂質壤土和壤土最為適合。砂質土保水力差，易使植株早期變黃或枯死。土壤酸鹼度以六至六·七最好，強酸性土壤不宜種植。豌豆亦忌連作，旱地應行輪作，如能與水稻輪作則更理想。

直播或糊種

本省栽培豌豆，一般都在秋冬季的九月下旬至十一月播種，但因各地氣候情形不同而稍有差異。北部地區因氣溫降低較早，可提早於九月中、下旬播種，中南部地區氣溫較高，可於十月中、下旬播種。

播種前先將圃地灌溉一次，使其保持相當濕潤，再犁起做畦。畦宜南北向，普通畦寬七十五至一百公分。畦高視土壤性質而定：排水良好而乾燥者畦宜低；排水不良而潮濕則應做高畦。畦做好後，於每畦中央開一條施肥溝，施下基肥，並與土壤充分混和。再整平畦面，用小鋤頭以每十二至二十四公分挖深約三至五公分小洞，以備播種。

如用糊仔栽培方法，在水稻收穫十天內每隔水稻三至四行，撥開一行（此即行距），再每隔水稻一株為豌豆株距。按此距離播種，豌豆行距約七十五至一百公分，株距約二十五公分。播種前與普通栽培一樣，用小鋤頭按預定距離挖洞再播種。

豌豆用點播法播種，每穴播種五至六粒，每公頃（約一甲地）種子用量五十至六十公斤。播種後覆土，最好用腐熟堆肥覆蓋。

豌豆肥料用量，每十公畝（約一

分地）可施用堆肥一千二百公斤，硫酸鉍二十公斤，過磷酸鈣五十公斤，氮化鉀三十公斤。如果土壤過於肥沃，肥料用量可酌予減少。施肥時先將堆肥、過磷酸鈣全量及硫酸鉍與氮化鉀半量，在播種前一次混和施入。其餘硫酸鉍和氮化鉀半量在播種後二十天做追肥一次施入。如行糊仔栽培，堆肥可兼做覆蓋土。水稻收穫後，將與普通栽培同量的基肥施入，立即培土。隔十五至二十天後，再行一次追肥。

灌溉·補植·除草

豌豆播種前後，土壤應經常保持濕潤，但積水過多亦不相宜。無論普通或糊仔栽培，播種前都應先行灌溉，使土壤保持適當水份。播種後發芽前不宜灌水。發芽後如發現缺株，應及時補植。除草和培土視實際情形而定，但應在生育盛期前停止。豌豆植株脆弱，應儘量避免翻蔓，以免折斷豆株。以後乾燥時應予以澆灌，如能配合施肥時澆灌最好。

採收適期

豌豆的採收適期，依品種而異。軟莢豌豆早生種自播種後六十天，中生種七十五天，硬莢豌豆中生種自播種後七十天，中生種八十天，晚生種九十天。北部地區栽培期間寒冷多雨，各品種均需延長至五十天採收。

豌豆的採收，更應視利用目的而定採收時間。例如軟莢豌豆採收適期應在豆莢有適當長度，但莢面平滑，豆仁尚未膨大以前採收為宜。以往一般農民種植臺中九號軟莢豌豆，都因過遲採收，以致莢豆變為粗硬，殊屬可惜。至於加工豌豆，則以豆莢飽滿而未黃熟時採收為宜。

謹告：全省農友們！

「山本」的農藥已不陌生了。
柑桔紅蜘蛛的大敵「山本DN乳劑15」。
一九六八年的最新原裝貨已經進口了。
使用倍數三〇〇〇倍，效果好，亦經濟，
選購時請認明新標貼！

農林省登記第1783號

醫藥用外劑物

山本

DN乳劑15

500cc

大阪 東京 熊本

山本農藥株式會社

大阪府和泉市府中町

新標貼說明

- 左邊（說明部份）
 - (1) 白底綠字
 - (2) 紅字部份「山本DN乳劑一五」，「大氣嚴禁」
- 右邊（圖案部份）
 - (1) 白底黃色直線條
 - (2) DN綠底黃字
 - (3) 乳劑綠底紅字
 - (4) 上、下部綠底白字
 - (5) 商標：紅底浮白字

日本·大阪
製造：山本農藥株式會社
進口：東益貿易股份有限公司
台北市双城街五號之二(二樓)
電話：543802