

，則溫度越高，發育越快；也就是說，中部十月中旬以後的氣候，最適豌豆生長。

土壤以含有機質，排水良好的砂質壤土和壤土最為適合。砂質土保水力差，易使植株早期變黃或枯死。土壤酸鹼度以六至六·七最好，強酸性土壤不宜種植。豌豆亦忌連作，旱地應行輪作，如能與水稻輪作則更理想。

直播或糊種

本省栽培豌豆，一般都在秋冬季的九月下旬至十一月播種，但因各地氣候情形不同而稍有差異。北部地區因氣溫降低較早，可提早於九月中、下旬播種，中南部地區氣溫較高，可於十月中、下旬播種。

播種前先將圃地灌溉一次，使其保持相當濕潤，再犁起做畦。畦宜南北向，普通畦寬七十五至一百公分。畦高視土壤性質而定：排水良好而乾燥者畦宜低；排水不良而潮濕則應做高畦。畦做好後，於每畦中央開一條施肥溝，施下基肥，並與土壤充分混和。再整平畦面，用小鋤頭以每十二至二十四公分挖深約三至五公分小洞，以備播種。

如用糊仔栽培方法，在水稻收穫十天內每隔水稻三至四行，撥開一行（此即行距），再每隔水稻一株為豌豆株距。按此距離播種，豌豆行距約七十五至一百公分，株距約二十五公分。播種前與普通栽培一樣，用小鋤頭按預定距離挖洞再播種。

豌豆用點播法播種，每穴播種五至六粒，每公頃（約一甲地）種子用量五十至六十公斤。播種後覆土，最好用腐熟堆肥覆蓋。

豌豆肥料用量，每十公畝（約一

分地）可施用堆肥一千二百公斤，硫酸鉍二十公斤，過磷酸鈣五十公斤，氮化鉀三十公斤。如果土壤過於肥沃，肥料用量可酌予減少。施肥時先將堆肥、過磷酸鈣全量及硫酸鉍與氮化鉀半量，在播種前一次混和施入。其餘硫酸鉍和氮化鉀半量在播種後二十天做追肥一次施入。如行糊仔栽培，堆肥可兼做覆土。水稻收穫後，將與普通栽培同量的基肥施入，立即培土。隔十五至二十天後，再行一次追肥。

灌溉·補植·除草

豌豆播種前後，土壤應經常保持濕潤，但積水過多亦不相宜。無論普通或糊仔栽培，播種前都應先行灌溉，使土壤保持適當水份。播種後發芽前不宜灌水。發芽後如發現缺株，應及時補植。除草和培土視實際情形而定，但應在生育盛期前停止。豌豆植株脆弱，應儘量避免翻蔓，以免折斷豆株。以後乾燥時應予以澆灌，如能配合施肥時澆灌最好。


採收適期

豌豆的採收適期，依品種而異。軟莢豌豆早生種自播種後六十天，中生種七十五天，硬莢豌豆中生種自播種後七十天，中生種八十天，晚生種九十天。北部地區栽培期間寒冷多雨，各品種均需延長五至十天採收。

豌豆的採收，更應視利用目的而定採收時間。例如軟莢豌豆採收適期應在豆莢有適當長度，但莢面平滑，豆仁尚未膨大以前採收為宜。以往一般農民種植臺中九號軟莢豌豆，都因過遲採收，以致莢豆變為粗硬，殊屬可惜。至於加工豌豆，則以豆莢飽滿而未黃熟時採收為宜。

謹告：全省農友們！

「山本」的農藥已不陌生了。
柑桔紅蜘蛛的大敵「山本DN乳劑15」。
一九六八年的最新原裝貨已經進口了。
使用倍數三〇〇〇倍，效果好，亦經濟，
選購時請認明新標貼！



新標貼說明

1. 左邊（說明部份）
 - (1) 白底綠字
 - (2) 紅字部份「山本DN乳劑一五」，「大氣嚴禁」
2. 右邊（圖案部份）
 - (1) 白底黃色直線條
 - (2) DN綠底黃字
 - (3) 乳劑綠底紅字
 - (4) 上、下部綠底白字
 - (5) 商標：紅底浮白字

日本·大阪
製造：山本農藥株式會社
進口：東益貿易股份有限公司
台北市双城街五號之二(二樓)
電話：543802