

或大白豬，產生之三品種雜交豬比較好。


藍瑞斯與杜洛克這兩個豬種在臺灣經七八年來繁殖飼養的結果，一致認為藍瑞斯繁殖性能好仔豬頭數多，且大小很均勻，生長亦很迅速。杜洛克則無論純種也好，雜交也好，生長都較快，因之我們將這兩個豬種好的性能結合起來產生一代雜交種母豬，再以明尼蘇達二號公豬來交配生產三品種豬。雜交豬生長極其迅速，且因其體軀長而高，對後代之體型亦可大為改進。至約克夏過去都指中型約克夏而言，現在已很少利用了，如果採大型約克夏（通常稱大白豬）取代明尼蘇達二號亦可。（臺灣種畜場周維誠）

兔養

【問】：（一）現本省北部地區是否有養兔合作社，其地址在何處？（二）現時臺灣地區是否有兔皮及兔肉加工廠？（三）兔皮及兔肉現在一般行情價格如何？

【答】：（一）在南投縣

欲組織養兔合作社，是否有補助，其貸款向何機構申請？（南投縣集鎮集里初中巷十五號劉文秀）



【答】：（一）現在本省並無積極活動之養兔合作社。

（二）設在屏東市的中日農畜加工廠可以購買肉。無大量經常收購兔皮之工廠。

（三）兔肉（屍體）一公斤約三十元。兔皮一張生皮在十元左右。

如組織養兔生產合作社，本金可經由合作金庫貸與，年息為每一萬元一千零八十元之五年貸款。（農復會黃嘉）

壤土

【問】：（一）新竹海埔新生地施用堆肥效果高

【答】：（一）新竹海埔新生地施用堆肥，用尿素與硫酸銨何者較好？（二）常施硫酸銨可否改良新生地鹼性土壤

【答】：（一）施用過磷酸鈣每公頃五百公斤與六百公斤，二者利弊如何？

（二）依海埔地肥料試驗，每公頃三要素施用要如何配合？（桃園縣龍潭鄉三水村五號鍾錦貴）

【答】：（一）本場過去在新竹海埔地試驗結果，顯示水稻施用硫酸銨與尿素對水稻產量之效應無多大差異，硫酸銨施用區產量為一百多時，尿素則為九十九・一%。

（二）連施硫酸銨，因硫酸銨之殘留，可能使土壤趨向酸性之現象，但施用硫酸銨可否使鹼分減少，本場並無試驗記錄。

（三）新竹海埔地土壤所含有效性磷較低，按照過去試驗結果施用過磷酸鈣對稻穀增產效應甚大，故施用每公頃六百公斤過磷酸鈣，可能對增產尚有利。

（四）鉀肥最好於插秧後三十日前使用，其比率為第一次追肥四十%，第二次追肥六十%對增產有效，但新竹海埔地土壤所含有效性鉀較高，按照過去之試驗結果顯示施用鉀肥之效果甚少。

（五）新竹海埔地土壤缺乏有機質，故堆肥之堆施甚為重要，氮之需要特別大，其次之至於鉀肥之效應甚少，按照以往海埔地肥料試驗初步成績觀之，每公頃施用量氮不可低於一百二十公斤，磷為六十公斤，鉀四十公斤以下較經濟而合理。（新竹區農業改良場彭遠民）

藥農

申請設立農藥行 尚無地域性限制

【問】：（一）目前農藥行的申請是否會受到地域性的限制，是否已實施管制

（二）家住彰化欲在南投開設農藥行，事先是否應辦公戶籍移轉？

（三）農藥行是否與百貨、種子兼營，而經營者之申請是否有學歷之限制，高農畢業是否可以申請，其手續如何？（彰化縣和美鎮望厝里彭新十一巷十九號鄭祥德）

【答】：（一）目前農藥行的申請設立並無地域性的限制及實施管制。以後可能實施限制

品質創造信譽・信譽保證品質

燕子牌農藥



產品項目

BH C 粉 劑
BH C 粒 劑
BH C 可濕性粉劑
BH C 藥生石粉劑
西馬賽可濕性粉劑
DDVP 乳劑
D 拉丹 乳劑
馬 殺多靈乳劑
益大 殺多靈乳劑
益大 殺多靈乳劑

所有登記證
有產品均

特巴順新
農拉米掃
松松農波
乳乳農液
劑劑劑劑
劑劑劑劑

順益化學股份有限公司

臺中縣清水鎮鎮南街一號 電話：45・341號

農友們 種植高麗菜 請選用中、南部已公認
最優良耐暑耐雨 冬季亦絕不抽苔
收量豐富的優良品種

US ヒット甘藍

（又名奇美60・奇特・初秋二號）

其他尚有優良品種 頂好甘藍（ベスト）

脫普甘藍（トップ）

初夏蒔エース甘藍

坂田中早生甘藍・宇治一號甘藍

最優良的卷心白菜 坂田濱光卷心白菜

種植胡蘿蔔獲利最多 今年還是趁早種植

八江農藝出品的新黑田五寸人參

雖然同名種子甚多還是八江（ヤエタネ）產品最優良最可靠

其他 各色 長岡交配種、交配蕃茄、甜
椒、高荳、香瓜等 日本・美國各色蔬菜
種子應有盡有 價格表函索即寄

台灣農產企業公司

直賣部郵政劃撥12799號 臺北市迪化街一段86號