

幾種果樹病蟲防治

張良傳 · 曾慶德

梨黑星病

此病多發生於梨樹的新梢、果實、果梗、葉面及中肋上，可用波爾多液來預防，最有效，其他如大生四十五、大生七十八或二十二也有效力，但因不如波爾多液有效故尚未被推廣採用，又在日本常在萌芽前，撒布PCP〇·五%加用石灰硫黃合劑，但易生藥害，故須在萌芽發出前施用。

波爾多在生果期施用常會染汚果皮尤其是赤色梨，故一般在結果前及採果後施用為宜。

梨黑星病在早春期病菌就開始活動，而在溫度達攝氏二十五度時，病菌活動最旺盛，故防治時應注意脫苞期至開花期能撒布二至三次六—六式波爾多液。並於結果以後改用大生四百倍防治。採果至落葉前再撒布一—二次四—八式波爾多液。

芒果炭疽病

炭疽病可用下法防治：撒佈四—三式波多液，開花前一次，花謝後一次，以後每月一次，至收穫前兩週為止。

或在幼果剛形成時用大生二十二或好速殺四百倍稀釋液，每隔十天噴藥一次。

介殼蟲

介殼蟲類，可以下列藥劑防除：
(一)用五十%馬拉松乳劑八百倍稀釋液，每九五公升中加入九十五%高級夏油一公升。
(二)以五十%大滅速乳劑加水一千倍，噴施。

香蕉象鼻蟲

香蕉象鼻蟲專門為害香蕉莖部，防治法：
(一)成蟲：經常去除枯葉老株。採用五十%地特靈可濕性粉劑七百倍稀釋液，在香蕉根部葉腋分叉處噴藥，但蕉果及果柄不可噴藥以免發生藥害。

每株噴藥量約三百五十公撮(C.C.)

(二)幼蟲：被害香蕉株，可在幼蟲蛀入部位的下方，注射「蕉特靈」一千倍，但沒有被害的香蕉株可不必注射，每株注射藥量，為稀釋液一百七十至二百公撮。

葡萄布袋蟲

避債蛾幼蟲本省農友俗稱布袋蟲，此蟲全年發生食性繁雜，大部份果樹葉均會被害，發生原因是由避債蛾成蟲產卵孵化後變幼蟲為害，一般在春季發生繁殖為害最多。

防治法：在無果實時可採用四十七%甲基巴拉松乳劑一千倍防治。如已有果實應採用低毒性及殘毒性較短的殺蟲劑，如八十%地特靈可濕性粉劑六百倍或五十%速滅松乳劑五百倍或五十%賽文可濕性粉劑三百倍防治(以上三種藥劑施藥後須經十天以上才可採果實。)

裕台農藥



■ 50% 特製甲基巴拉松乳劑
農藥字〇四二〇號

■ 50% 甲基獨一乳劑
農藥字一三〇四號

■ 50% 乙基飛快殺乳劑
農藥字一一六〇號

■ 50% 飛滅水和劑
農藥字〇四二二號

■ 50% 加保利水和劑
農藥字一三八七號

■ 特製3% BHC粉劑
農藥字一三九八號

新銳！
堂堂推出！

特效！

現貨彰化供應處

信東農藥行

彰化縣員林鎮中山路十號之六
電話一六二號

裕台企業股份有限公司農化工業廠

地址：彰化市中華路一六二號 電話：四〇四四號
總公司：台北市衡陽路四十六號