























## 花椰菜義大利種原







從國家種原庫收集之義大利不同品種(系)之花椰菜種原，由農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所種植繁殖與記錄性狀，同時提供業界相關資訊，調查項目包括葉色之濃綠程度、葉基小葉之有無、葉面浮泡之有無、葉姿直立與否、葉柄長短、葉面平凸與否、葉片皺波程度、內葉彎曲情形、葉片的大小、葉面臘粉多寡、葉緣波紋程度、葉尖的形狀、葉形、葉尖扭曲程度、主脈寬狹程度和葉面光澤之有無。







Precoce di Lesi					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(中)	葉柄長短(長)
		葉姿(直立)	葉面(凸)	葉片皺波(弱)	內葉(部分彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(強)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(弱)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)
Precoce di Toscana					
		葉色(綠)	葉基小葉(無)	葉面浮泡(無)	葉柄(短)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(強)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(小)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(無)	葉尖(圓)
		葉形(狹倒卵形)	葉尖扭曲(弱)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)







<b>PI 231209</b>					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(部分彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(無)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(寬)	葉面光澤(有)
<b>Tardia Marzo</b>					
		葉色(綠)	葉基小葉(無)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(長)
		葉姿(直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(無)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)
<b>Swiss Hsui Chiu</b>					
		葉色(綠)	葉基小葉(無)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(部分彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(無)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)

Ye Erh Fu					
		葉色(綠)	葉基小葉(無)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(部分彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(無)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)
Ye Er Fu					
		葉色(綠)	葉基小葉(無)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(部分彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(弱)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(寬)	葉面光澤(有)
Broccolette Neri e Cespuglio					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(長)
		葉姿(直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(小)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(弱)	葉尖(略尖)
		葉形(狹倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(狹)	葉面光澤(有)

<b>Gigante di Napoli Gennaio EX</b>					
		葉色(綠)	葉基小葉(無)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(弱)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(無)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(寬)	葉面光澤(有)
<b>Gigante di Napoli Febbraio E</b>					
		葉色(綠)	葉基小葉(無)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(弱)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(弱)	主脈寬狹(寬)	葉面光澤(有)
<b>Gigante di Napoli Natalino EXT</b>					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(弱)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(寬)	葉面光澤(有)

<b>Jezi</b>					
		葉色(綠)	葉基小葉(無)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(部分彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(中)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(強)	主脈寬狹(寬)	葉面光澤(有)
<b>Gennarese</b>					
		葉色(綠)	葉基小葉(無)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(強)	內葉(部分彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(無)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(寬)	葉面光澤(有)
<b>Gigante di Napoli Marzatico</b>					
		葉色(綠)	葉基小葉(無)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(半直立)	葉面(凸)	葉片皺波(弱)	內葉(彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(無)	葉尖(略尖)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(寬)	葉面光澤(有)

<b>Marzatico</b>					
		葉色(綠)	葉基小葉(無)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(中)	葉緣波紋(無)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(寬)	葉面光澤(有)
<b>Natale</b>					
		葉色(綠)	葉基小葉(無)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(弱)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(無)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(寬)	葉面光澤(有)
<b>Violetto</b>					
		葉色(紫綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(中)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(中)	葉面臘粉(少)	葉緣波紋(中)	葉尖(略尖)
		葉形(倒卵形)	葉尖扭曲(弱)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)

Romanesco					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(長)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(無)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(中)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(寬)	葉面光澤(有)
Di Sicilia Catanese					
		葉色(綠)	葉基小葉(有)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(中)	內葉(部分彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(多)	葉緣波紋(無)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(弱)	主脈寬狹(寬)	葉面光澤(有)
Cavolfiore Precocissimo di Jez					
		葉色(綠)	葉基小葉(無)	葉面浮泡(無)	葉柄長短(短)
		葉姿(半直立)	葉面(平)	葉片皺波(中)	內葉(不彎曲)
		葉片大小(大)	葉面臘粉(少)	葉緣波紋(無)	葉尖(圓)
		葉形(寬倒卵形)	葉尖扭曲(無)	主脈寬狹(中)	葉面光澤(有)