

# 亞麻收穫調製分級捆包注意事項

陳廷煥

亞麻生育期間很短，麻莖和種子產量高，而又不怕霜害，利益優厚，適合本省水田冬季裏作栽培。經過幾年來政府有關機關和亞麻廠積極的推廣，現在中部栽培面積已逐漸普遍增加，但為提高亞麻的收量，除了初期栽培管理技術外，並應注意收穫、調製、分級和捆包等工作。

## 收穫

亞麻收穫時期不能過遲。種子過熟時，種子產量雖可增加一點，但是麻莖品質惡化，品質不良。

本省栽培亞麻，是以收穫原莖，採取纖維為目的，所以必須注意麻莖的品質。通常發現胡果變成黃褐色

的達五分之二，黃色達五分之二，又有五分之一為青色，亞麻莖的下端三分之一部份落葉，中間部份三分之一變黃色，這就是收穫的適期。此外，從栽培品種也可推算出收穫適期。例如「臺中選一號」品種，一般在播種後一百一十天左右就可收穫。

收穫亞麻時，用雙手握緊梢部，然後用力拔起，打齊根部，並用腳踢去根部泥土，然後展開在畦上曬乾。通常約晒二至三天，其間翻轉一至二

次，晒至七、八分乾時，拿起短亞麻，把麻莖結束為直徑二十公分的小把，運回家裏堆積。

拔麻時，要注意不要把雜草及細矮的毛亞麻一起拔起來。晒乾時如遇下雨，可暫時把十五把左右的亞麻放在一起作一堆，梢部向上，併立成弧形，上面再用稻草遮蓋。

## 調製

(1) 堆積：堆積一方面為增進亞麻品質和外觀，一方面又可使種子進行追熟作用。亞麻攤開在畦上晒到七、八分乾時，運回家裏堆積。堆積場所要能避免日光直射和雨水淋濕。簡單的方法，是先用粗竹桿作成支架，離地約二英尺，以防浸水，然後將麻把逐一堆放在架上，穗部向外，根部向內，將小把交互堆積，頂蓋草領，以防雨水淋濕。

(2) 脫種：脫種就是把麻莖梢部的種子用脫谷機脫落。亞麻堆積二至三星期，至麻莖變成光亮如枇杷色時，就可取出脫種。

## 分級

亞麻廠收購亞麻莖，按照等級而訂有不同的價格，所以，分級後才能按照品質好壞獲得公道的價錢。如果麻農不自行分級，而將好壞不分的麻莖一起出售，難免要吃虧。

亞麻分級，通常是按麻莖的長度、形狀、粗細、色澤，和麻根的形狀等項目選別，把它分開捆紮。

(1) 麻莖長度：莖長七十五公分，株高九十公分，是「臺中選一號」亞麻的標準莖長。

(2) 麻莖形狀：細長而直立的

是最好。有分枝或彎曲的不好。


(3) 麻莖粗細：亞麻莖最適當的粗細度，是把麻莖平放，麻莖莖根部三分之一地方，可在三分公分的寬度內排列二十二至二十三支為最佳。

(4) 麻莖色澤：麻莖外觀，以有光澤的枇杷色為最好，黃色或黃白色的為其次，青綠色或黑褐色和不够光亮的都不好。


(5) 麻根形狀：麻根形狀以細長而筆直的為最好。粗大的蘿蔔狀或鬚根多或彎曲的都不好。

## 捆包

將品質相同的亞麻，各捆成直徑十五公分的小把，再把小把的根端向外，梢端在內，捆成淨重三十公斤，直徑五十五公分，長一百公分的大捆，用草繩分三處捆紮，每紮二圈打死結，兩端要打齊。




。法方收穫初期適收穫亞麻：一圖



。乾晒後收穫：二圖



。標準細粗莖麻：三圖



。法方包捆：四圖