

冬季裡作

常見的

蔬菜病蟲害

本省蔬菜栽培面積，近年來顯著增加，產品除供國內市場需要外，部份並供應國外市場，爭取外匯。尤以冬季裏作，為本省蔬菜生產旺季，種類既多，產量亦大，茲將冬季裏作蔬菜的主要病蟲害防治方法簡介如下：

白菜·甘藍·蘿蔔 ·芥菜·花椰菜的 病蟲害

斜紋夜盜蟲：生育期發生本蟲，可用二五〇DDT乳劑三百至五百倍（採收前廿一天停止用藥），或用六四·五〇「大必隆」乳劑一千倍（採收前四五天停止用藥）防治。

小菜蛾（吊絲蟲）：發生時噴射六〇「大必隆」乳劑一千五百倍（採收前兩星期停止用藥），或六四·五〇「大必隆」乳劑一千倍（採收前四五天停止用藥），或「蘇力菌」每公頃〇·四至〇·六公斤一千五百倍，每隔十天用藥一次。

蚜蟲：發生時噴射六四·五〇「大必隆」乳劑一千五百倍（採收前四五天停止用藥），或五〇「益農藥」乳劑一千倍（採收前十五天停止用藥）。

· 忠慶陳 ·

。噴藥時必需噴及葉背及下葉部份。

露菌病：發病初期噴射「鉍乃浦」或「鉍乃浦」四百倍稀釋液，每隔七天一次，連續三至四次。噴藥時必需噴及葉片的上下兩面。收穫前七天停止用藥。

軟腐病：結球前施用一二·五〇「武田黴素」液劑一百倍或一六·五〇「農黴素」一百倍可濕性粉劑五百倍，每隔七天一次，連續四次。此外，尚需注意排水。

豌豆·花豆（鵲豆） ·四季豆（敏豆） 的病蟲害

播種前先按土壤害蟲防治方法施行土壤處理。其他常見病蟲害如下：

小綠浮蠶子：發生時施用二五〇DDT乳劑二公升五百倍液，或五〇「加保利」可濕性粉劑每公頃一公斤。

紅蜘蛛：豆類在開始採收前以一八·五〇「開路生」可濕性粉劑加水五百倍防治。

豆英螟：菜豆開花時，噴射五〇「加保利」可濕性粉劑加水一千倍，每隔七至十天噴射一次。噴藥後二天採收。

銹病：播種後二十至三十天或花蕾開始萌出時隨即噴用「大生四五」或「鉍乃浦」或「鉍乃浦」四百倍液一次，以後每隔七至十天噴藥一次，共四次以上。噴藥應噴及葉片上下兩面。

台

品質！
保證！

藥

牌卦八

商標 註冊

△ 50% 大	△ 25% 菜	△ 50% 菇	△ 24% 快	△ 50% 特製加保利水和劑	△ 10% 特製DDT粉劑	△ 25% D
滅	立	菜	殺	乳	乳	強力！特效！
速	淨	寶	乳	乳	粉	乳
農藥字〇七三一號	農藥字〇六七三號	農藥字一三〇七號	農藥字一三〇九號	農藥字一三八七號	農藥字一四〇五號	農藥字〇四七五號
劑	劑	劑	劑	劑	劑	劑

裕

曲

廠工化業農司公限有份股業企台裕

號四四〇三話電 號六二一路西華中市化彰：址廠

號四十六路陽衡市北台：司公總