


一月下旬至翌春。秋季分株，需另行育苗，春季實施分株，可直接栽植。分株繁殖，植株生育旺盛且快速，待開花時，下葉枯黃，形態不良。

**扦插繁殖：**菊花繁殖，以扦插最重要。扦插有切取莖先端約六、八公分長，作為插穗之「頂芽插」，與繼而用其下方三莖節之「莖插」，以及只帶一枚葉片之「一扦插」等，其中以頂芽插最易管理，發育亦良好。扦插時期，小菊是四月上旬，中菊及大菊為五月上、中旬較好，扦插用砂箱，砂以河砂為宜，扦插方法，行距十公分，株距八公分。扦插後約二十日可發根。



插杆土碎

### 製培養土

為求栽培良好的盆栽菊，必需有良好的培養土，而理想的盆栽菊培養土，應具備以下四點：(1)自始至終膨軟合適，不致硬結成塊。(2)空氣流通良好。(3)排水良好，保水力強。(4)富於吸肥性。

盆栽菊之培養土，應自冬末開始堆積。選潤樹枝葉，用刀切碎，然後堆積，使其腐熟，並每月翻堆一次。四月間，將腐枝葉，用五厘孔篩去微粒，並用鐵鍋焙炒，以消毒去除蟲卵病菌，混合三分之一心土(心土選用土曬乾，打碎成二、三分直徑之顆粒狀)，即可作盆栽用培養土。每次換盆，均需填充新培養土。

### 調製肥料

菊花肥料，三要素之此例以五：三：二或五：四：一較理想，一般追肥之施用，均用特製之乾燥肥料。早春用豆餅、米糠、骨粉及糞培養土，按照

八：三：二：五之比例混合，加以適當之水，裝密封罐，兩週後再加水，醱酵完了，曝曬乾燥後備用，其施用標準如下表：

| 三幹整 | 基肥    | 追肥    | 加強肥   |
|-----|-------|-------|-------|
| 厚物型 | (上盆時) | (換盆時) |       |
| 品管粗 | ●五四公升 | ●一三公升 | ●一三公升 |
| 管細  | ●二七公升 | ●一公升  |       |
| 細、針 |       |       |       |
| 鬲斗  | ●一八公升 |       |       |

### 展覽盆菊

栽培展覽菊，目的在參加展覽或比賽之用，以培養肥大為貴，普通每盆僅使其開一、六朵花。扦插適期為五月上中旬。五月下旬至六月上旬，可定植於三寸盆中，當根全部充滿鉢內，約每隔二十日左右，換盆一次，由三寸盆換至五寸盆，再換入七寸盆，最後移入九寸盆中。

菊苗生長五至十公分時，即可摘心，藉以促進腋芽生長，依留主枝之多少，而成單幹式、雙幹式、三幹式，或四幹式、五幹式、六幹式等不同，最後每幹留一正蕾。

展覽菊之整枝最重要，植物之生長，枝葉必往上伸長，故應以鉛絲或竹枝籤(帶分枝鉤)將其分枝分次慢慢往下壓平，切忌急速壓下，否則分枝點有裂斷之虞。至盆沿位置，可令其向上生長。

展覽菊最標準者，花差以花朵之厚度為準，而分枝差與花差應相等，且分枝與鉢沿線應平行，連盆高度在一、三公尺者，最標準。一般評定菊花，均依此標準。

### 管理要點

灌溉：盆栽菊因為植株之生長，僅局限於盆鉢內，培養土之保水力有限，其生長期間，大部份是在夏季，需水甚感，每日應灌水二、三次，尤其在九十月間，花蕾形成，花朵長大，均需要大量水份

◎ 膠質可濕性水和硫磺

# エスロン

◎ ウドンコ病、サビダニ、着色増進の特効薬

登記證第1067號

◎ 特別推薦 農家 農藥 試驗場

增進透性 1 萬倍 廣效 毒劑

# 愛展

現貨供應 型錄備索

正老牌展箭劑愛展姐妹品

# AGRAG

(愛潛力)

◎ 日本細井工業株式會社榮譽出品

◎ 滅蚜蟲特效藥 (第2批貨再度進口)

SAYFOS 70

# 賽福施 70

◎ 英國植物保護公司榮譽出品

登記證第309號

台灣 經華實業股份有限公司 電話：558680  
總經理 台北市長安東路一段17巷10號

賽福施70 經銷商  
● 台南一達業農藥資材行(台南市公園路409號)  
● 高雄一慶雲農藥行 (鳳山鎮第一市場73號)  
● 屏東一民豐農藥行 (林邊鄉美華路1號)