

之供給，每日需灌水三四次。

摘除腋芽：七、八月間，大菊生育旺盛，主幹上部各葉間，均能抽出腋芽，腋芽長二二三公分時，以指尖摘除，如發育過盛品種如管物系統，為分散其強勢，可待四、五公分時摘除。但到發生花蕾前，為準備副蕾，則應留一二腋芽，不予摘除。

柳芽處理：八月間陰雨連續日久，在先端易發生柳芽，柳芽可謂「奇形花」，柳芽下端有二三四片細長之葉，即為柳葉。柳芽如放任生長，不會開花，如僅摘除柳芽，自柳葉部分亦不會再形成花蕾，故應將柳芽柳葉部分全部摘除，而留其下之正常腋，以代替主枝，同時將以下之腋芽摘除，使其發育良好。




切除柳葉柳芽

防暴風雨：夏季驟雨多，應以鐵皮遮雨，雨後應即除去鐵皮，而七月至九月間，颱風季節，為防棚架竹簾、鐵皮吹落，將枝葉折斷，應於颱風來臨時，搬入玻璃房或屋內，颱風過後後，立即搬出。並即噴佈藥劑，預防病蟲害之發生。

花座扶托

：扶托大菊每一主幹均應立支柱一根，待花瓣開始開放時，即將支柱齊花架剪去，並置花座扶托。花座係使花姿增加美觀之補助具，用鉛線作成。花座之大小，和各品種滿開時直徑大小有關，其標準大體如下：



花座扶托

花型	花座直徑
厚物・厚物走開	十二・十三・五公分
厚物大攤開・粗管・間管	十五・十八公分
細管・針管	十三・五・十五公分

花壇配置：花壇均設於露天，花開七、八成時，即可排裂型花壇，排裂高矮應求整齊美觀。而參加花展的花朵，則應滿開，為求花朵開得快，顏色達到標準，待花瓣明露時，除去竹簾覆蓋給予充分日照。花展日的在作考評，花之高矮分別放置，

顏色亦應分配得適。

病蟲防治

盆栽菊應保持所有葉片之完整，不能有病斑及蟲咬痕跡，故平常即應注意防範未然，每隔五至七日噴佈一次藥劑。

白銹病：在攝氏十三十八度下最易感染，發生前，可用水和硫磺粉，薄薄撒於葉面，罹病葉應予摘除。

黑斑病：可用四丁四式石灰波爾多液，或農微素一千倍液，或大生四百倍液防治。

蚜蟲：可用 DDT 乳劑、馬拉松乳劑，或魚藤精乳劑防治。

食心蟲：用馬拉松乳劑噴佈花心部分及心芽部份。

紅蜘蛛：在六、七月間易發生，可用克氯苯、鐵定旺等一千倍液防治。

花腐病：發現花瓣黃褐化時，應速摘除，避免多濕及氮肥過多。

葉綠蟲：葉變褐色而枯死，應用「毒線蟲」防治。

菊天牛：五月下旬至六月中旬發生，產卵在基部葉中，發現時可捕殺之。

菊椿象：體小綠色，五月下旬出現，吸取新梢汁液，用硫酸煙精八百倍液噴佈。

現貨進口經銷商：

- 一、裕盛公司農化廠：彰化市平和里平和莊五十號
- 二、惠光貿易有限公司：臺南市東門路二二一號
- 三、群英公司：台北市南京東路二段一〇九號三樓
- 四、英明貿易有限公司：基隆市郵政信箱八六號
- 五、福慶公司：臺北市漢口街一段五十七號二樓

臺灣總代理：

青象貿易有限公司

臺北市漢口街壹段壹肆號壹樓壹室
電話：三六一一七七

說明書函索即寄

美國賓州費城門哈司公司登記商標

MINOC
SUBSIDIARY OF
ROHM AND HAAS COMPANY | PHILADELPHIA
裝包新 / 口進新
八十七生大*

農林廳農藥登記證第五八九號

DITHANE Z-78
Net Weight 1 KILO
Agricultural Fungicide
MINOC

壹公斤法國原裝

ROHM AND HAAS PHILADELPHIA
PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19105 USA

DITHANE M-22
AGRICULTURAL FUNGICIDE
ROHM AND HAAS

省農林廳農藥登記證第一六一號

*大生二十二 美國三磅原裝