




蚶仔養殖

—— 順 永 賴 ——

本省的經濟蚶類有兩種，一為血蚶，另一種是毛蚶，通常都混稱為血蚶。這兩種蚶仔可由其殼上之放射狀肋數加以區別。血蚶之放射狀肋只有十七至二十條，毛蚶為三十至三十四條，同時，一般的毛蚶較血蚶大。

據統計，本省蚶類的養殖面積共有一百四十四公頃，除毛蚶七公頃外，其餘都是血蚶，分佈於嘉義縣以南淺海地區。每公頃收益視養殖場的生產力及放養密度各有差異。平均為新臺幣一萬五千零八元左右。

血蚶因價格特高，種苗也貴，因此養殖血蚶需要很大的資金，種苗價格每公頃一千五百粒左右者約一百四十元。毛蚶的價格較差，成員平常只有血蚶的四分之一，因此養殖者並不多。蚶仔的養殖可分為種苗的育成及成員的飼養，以下就血蚶的養殖方法簡介於後，以供參考：

棲息沙泥淺海

血蚶棲息於風浪不大的泥質或沙質的淺海，底土需要十五至三十公分的軟沙，且無海藻的發生。海水的比重以一·〇〇八至一·〇一四為宜，毛蚶以一·〇一八至一·〇二〇為宜，因此養殖場（或漁場）需要稍有陸水流入的地區較理想。另一為在干潮時，能干出五至六小時的深度（毛蚶則無需此條件，而需干潮線外至水深十公尺的範圍）。

本省的分布地點是嘉義縣東石、新塢、臺南市鹿耳門和臺南縣北門等地，毛蚶則以臺西、七股、將軍和屏東縣大潭產量較多。

劃區育成種苗

種苗的育成，據民國五十三年之調查只有嘉義縣新塢區好美里八拿溪下流溪畔附近，惟目前在東石鄉、布袋鎮等地，也有種苗出售。種苗出售種苗場普通以三百至一千平方公尺的面積劃為一區，周圍以竹竿為柱每隔二公尺一枝，並需高出地面二公尺，再以一公厘目之塑膠網圍繞至一公尺高以防貝苗流失。在二至七月間採集稚苗或收購每公頃二萬至三萬粒之稚苗，播種於每股二米寬的地方，每股散播〇·二—〇·五公頃，撒播需要平均不得疎密不同。至七月間部份可能成長到每公頃五千粒，此時就要開始疏捕出售各地業者常作種苗。經養成一年，稚苗可增加至八倍左右。種苗價格五千粒一公斤者約為二百四十元，一千五百粒者約為一百四十元。

選擇養殖適地

選擇養殖適地養殖場干出時間不要超過六小時，否則夏天往往因干出面溫度高達攝氏四十度以上，血蚶會吐出粒液經數日即斃死。海水比重在一·〇〇八至一·〇一四範圍，太淡太濃都不適宜。軟泥深度在十五至三十公分左右，軟泥太多不好。

無海藻類的地方，藻類太多不但影響潮水暢流，同時枯死的海藻會嚴重地影響貝類的生活條件。

養殖管理簡便

血蚶的養殖非常簡單不需任何特別管理。本省放養時間概在六、七月間以後，如以每公頃五千粒為種苗者約需兩年始可收成，如以每公頃五百至六百粒為種苗者，大約一年後即可出售，每公頃一百粒左右。在播種時最重要者為密度問題，而密度當視養殖場之生產力及環境來決定，故無法指出普遍適用之密度，為參考起見將本省各地之放

養量例示於後。

東石每坪六十公斤。布袋一百公斤。新塢一百公斤。將軍二十五公斤。七股一百公斤。臺南市二百公斤。

高雄市六百公斤。日本每坪一千至三千粒，種苗，毛蚶為每一·八升二百五十至五百粒。

血蚶在養成中雖不需任何特別管理（當然不投餌），但是為了預防失竊最好在養殖場的周圍，插上竹枝或竹片以為標示，同時經常巡視。為提高養殖場的生產力，最好採用輪作或養殖二至三年休息三十五年，如有可能，在收穫後將養殖場以動力漁船拖曳加以耕耘，則頗可有效的維持生產。至於毛蚶的養殖方法大體上與血蚶相同，可參照血蚶養殖方法實施。

＊

＊

＊

生薑加工外銷

—— 明 啓 潘 ——

目前生薑加工外銷，以醃薑與糖薑兩種為主。醃薑生薑，每年外銷約一千三百萬公斤；糖薑每年外銷約二十萬公斤；另有鮮薑，每年外銷亦有三百萬公斤。醃薑是以日本為主要外銷市場，糖薑是以東南亞國家及美國華僑為主要消費對象。鮮薑的主要市場為香港與新加坡。

生薑加工廠多集中中南部。北部地區如：金山農場股份有限公司（臺北市中正路一四〇號），宜蘭三星鄉，三星水果加工站（宜蘭縣三星鄉大穩村一九號）。中部如：彰化王子飛品公司（員林鎮中山路四四六號），玉山蜜餞公司（員林鎮浮圳路二十九號之一），均有醃漬生薑加工輸出，生產者可就近前往洽售。

目前因加工廠聯營外銷，未曾取得全體合作，外銷價格跌至每桶淨重（四十五公斤）八十美元。過去最高時曾賣十二美元一桶。為外銷價跌落，以致影響原料生薑收購價格，最近又自每公頃新臺幣九元跌至七元，再跌至五元上下。（臺北新店鎮雙坑里十份路一號之二陳英程農友詢問生薑加工外銷情形請參考。）