

品種土壤植期

——昌培陳——

、生長特性如次：

「福羽」：是六十年前日本人福羽逸人博士從法國品種的實生苗選育成功的品種，極早生，植株生長稍弱不耐暑，果實最大。有三十公克重，長圓錐形，果數少，適於促成栽培（保溫早採栽培），若管理得當會結成重一百公克，長六・七・五公分大的果實。成熟後呈濃紅色，果肉帶紅色也是本品種的一大特點，甜味中，稍缺酸味與香氣，食味良好。株形大，果梗粗長，在本省適於青果、冷凍加工用，製造草莓果醬稍嫌香氣不夠。每十公畝產量一千四百至一千六百公斤。

「福羽」能耐低溫，但有不耐乾燥，不耐暑與容易發生白粉病等缺點，在田間應作適宜的保護。到生長花梗開花後會發生抽枝，務早摘除以免消耗養份。

馬歇爾：又稱阿美利加，中生種，植株生長旺盛，適於粘質土，着花性中等，果實扁圓，初期大而後期小，果數多，產量高。果皮不太紅，肉質白不緻密，甜味濃酸味中，香氣強，味中等。

後不糊，大湖鄉農友多採用此品種作果醬原料，因耐暑且在平地育苗容易，使早期育成的大苗，可以增加產量。

達娜：早生種，植株生長中等，果實中大，圓錐形，果肉紅而緻密，具有芳香，食味良好，是青果用品種。第一花叢易生畸形果，側枝發生晚少。「達娜」不耐乾燥，在栽培期應注意田間保持適當的水份。在新竹地區種植多。


利用冬閑稻田最為經濟

草莓選土性不嚴，只要通氣，保水性好的肥沃砂質壤土或壤土地，均適於栽培。在砂質土壤初期生育旺盛，採收期早，但因會早衰弱致減少產量，重粘土由於定植後根發育差，冬後生長慢，果實生產量低，不適於生長。在過濕地，根部不能充分伸展，容易衰弱後枯死。

本省草莓有十月至十二月採收與三月至六月採收的二種栽種方式。在大湖鄉是採用後者，為配合水田土地利用及勞力，在刈收第二期水稻後，犁翻整地定植草莓，如此使用冬季休耕地與第一期稻作地，可用婦女等家庭勞力栽培管理，草莓的除草與採收調整工作需工較多，但不與稻作勞力競爭，在調節稻作農家勞力上非常有效。該鄉每戶平均栽培面積是二十公畝地。

在水稻刈收後全面撒布堆肥，每公頃三千公斤，過磷酸鈣八十公斤，氯化鉀二十公斤作全層施肥，然後耕耘。為根羣充分發育，磷肥以基肥施用，在易乾燥地，磷肥肥效顯著，在冬季根能順利生長，增加耐寒性，加強吸水力，使花等能够健全發育，至於氮肥在水田地不宜多用，多以追肥使用。

中日合資



三笠農藥

農林廳農藥登記證農藥字第1447號

新發售！

速全殺 MTMC



黑尾浮塵子・褐飛虱・最速効・長効藥劑

台灣三笠化學工業股份有限公司
日本三笠化學工業株式會社合資
彰化市大竹里大竹莊145號 電話2633號