

十五萬零七百一十八元，大部份為設置獸醫人員的費用，已使地方獸醫人力增強並增加就業的機會，一舉數得。（請參看附表二）

新闢財源支助

家畜保險是長期性的經建事業，且具社會保險性質，意義很重大。但在本省創立本事業，其業務由農會承辦，政府僅予行政上的監督和技術上的輔導，五年來雖已收相當成效，但因無資金的支助，尚未達到普遍推廣的地步。因此政府最近制訂「臺灣家畜保險事業費征收管理辦法」一種，凡申請屠宰畜時每頭收取一元五角，豬一元，作為發展家畜保險事業的基金。本辦法已於今年十月一日起開始實施，確信將有助於今後本省家畜保險的發展，對於猪隻的增產必有莫大的貢獻。

木薯（樹薯）栽培要點

本薯品種，因塊根肉皮色，而區分為二，即白色種和紅色，適宜本省栽培的品種，以白皮種為多，優良的品種，有「爪哇四號」等白皮種。

氣候土宜

本薯為多年生灌木。在本省春季二十四月間扦插，經過十個月後可以收穫塊根。這是一種粗放作物，生育強健，本省南北各地均可種植，不過要注意風害，避風處種植，較為安全。對土壤的適應範圍很廣，除了重粘土，或低濕排水不良地不適宜生長之外，各種土壤都可以栽培。但是表土深厚的壤土，或砂質壤土最為適宜。

整地插植

栽植地宜深耕，耕土六七寸。高地或傾斜地，插植時不必起畦，成活發芽後再行培土成畦。較低濕的平地栽培，就要築畦插植。繁殖用短莖扦插，插穗宜用母株中下部位的莖

附表二・民國五十二年至五十六年家畜保險投保及直接受益農戶統計

年 度	投 保 農 戶 數	投 保 頭 數	死 亡 頭 數	領 取 金 額	發 病 頭 數	享 受 免 費 醫 療 金 額	受 益 農 戶 數
五十二年	二九、廿三	二八、三九	四〇四	二五、八三·六	一〇、九三	一三、五〇·二	二、七三
五十三年	三五、三九	三三、一五	一、九五	八三、二三·三〇	二五、三〇	九〇、六八·九五	三、八九
五十四年	四〇、四〇	三四、六四	二、一三	一、〇〇、二四·八	二六、四三	一、〇〇、四三·四	四、七〇
五十五年	三三、三六	三三、二七	一、八三	一、八三、六六·三	一六、二三	一、六六、〇五·三	四、七〇
五六年	三一、〇三	三〇、三〇	五、〇四	二、三四、四四·四	二〇、八五	一、九三、三三·三	四、〇三
計	二三、四四	二三、四四	六、〇三	六、〇三、〇三·三	三一、六〇	五、五一、〇四·六	一三、七三

繆進三

收穫調製

木薯插植後約十個月左右，下部葉枯黃塊根肥大，即可收穫。收穫前先將莖幹砍下，懸掛陰涼乾燥處所，以供翌年種苗用。塊根可用鋤或犁掘起，每公頃可收塊根兩萬至三萬公斤。製成澱粉四十

六千公斤。

新鮮木薯的根莖葉各部分都含有氰酸毒質，加熱後才會消失。新鮮塊根必須先經浸水二十四小時，煮熟後才可食用，否則中毒。乾的木薯簽，煮熟後無毒，可為飼料。栽培木薯的主要目的是供製造澱粉用。（製木薯粉工業，在本省南投縣南投鎮最盛行。）木薯粉除煮熟後可供食用外，過去工業上以木薯粉用為織紗原料，現在則製造味精原料，需量相當多。

病蟲害

木薯有時發生斑點病，要注意燒燙被害葉和避免連作。蟲害有介殼蟲和紅蜘蛛為害，可撒佈BHC粉劑或可濕性粉劑防治。（附註：花蓮縣新城鄉嘉里村新莊四號王振興農友，來信詢問樹薯栽培法請參考。）