

**ROHM AND HAAS**  
**PHILADELPHIA**  
PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19105 USA



# \* 大生四十五 (DITHANE® M-45)

# 新進口！ 新包裝



號二二農藥登記磅紙袋裝原青象貿易有限公司

興農化工股份有限公司  
台中縣大肚鄉中和村中山路10-6號  
電話：04-2177106  
台灣總代理：

司公斯哈門羅城費州標商記美

例一：日本三重縣每十公畝施肥量（公斤）

種類	總量	基肥	追肥	肥料
磷	一七・四	二・〇	一五・四	
氮	一八・七	三・一	七・八	七・八
氧化鉀	一九・二	一・二	九・〇	九・〇
硫酸銨	二一・五	四一・五	九五	
過磷酸鈣	四七	九四	一四一	
氯化鉀	五一六・五	三八		
苦土石灰	一〇〇			

例一：臺灣省農林廳種苗繁殖場每分地之施肥量（公斤）

基肥於播種前撒施或條施於播種溝中，第一次追肥於發牛葉（一二片時）施用，第二次追肥於葉六七片時施用。

除草的工作，水田後地雜草較少，但旱田則初期之雜草相當嚴重，故以施用除草劑較經濟。在萌芽前，於播種灌漑後第三天，噴布 P.C.P. 鈉鹽一。

硫酸銨 三一・五 四一・五 九五  
過磷酸鈣 四七 九四 一四一  
氯化鉀 五一六・五 三八  
苦土石灰 一〇〇

二公斤（十公畝），或亞脫淨（Atrazine）一百公克（十公畝）。萌芽後，在播種後一個月發生葉片一至二片時，即施第一次追肥，後每十公畝噴布二·四一D或亞脫淨一百公克，於第二次追肥後，視情形再施用一次。

播種後應注意灌溉以保持土壤的濕潤，使子球發芽整齊，天氣乾燥時，一般在播種後一個月內，約每五至七天灌水一次，發芽整齊後，約每十至十五天灌水一次，發生葉片六至七片後，約每二十天灌水一次，於收穫前一個月應停止灌水，以免影響球根的成熟期和品質。

## 半年後收穫種球

於播種後六至八個月，莖葉上部三分之一變黃時，即為收穫適期。過早收穫子球大多未成熟，過遲則子球容易脫落。收穫時先將地上部之莖葉刈除，再用牛犁將大球收起，捨去子球。另設種球圃收穫子球。

若數量少時，可數十球一束掛在通風室內陰乾，或放在攝氏三十度溫度下，乾燥五天，使球莖表面之傷口癒合，再將老球與根除去，分級包裝。唐菖蒲根之分級標準，特級球周十四公分以上，一級球周十二至十四公分，二級球十一至十二公分，三級球八至十公分，四級球六至八公分。

在日本每十公畝可收七十萬三級以上之球根。

，十公畝所需之栽培勞力，約需三十工左右。

由外國進口或在臺灣繁殖之唐菖蒲主要病蟲害

，有根軟腐病、鼠徵病及根蟲，兩者常混在一起，使貯藏期間及栽培時，球根腐爛，影響產量。故於貯藏或定植前宜用谷樂生一千倍加五十%巴拉松乳劑一千一二千倍液浸三十分鐘，可預防此兩種病蟲害，此外應注意園地排水，避免連作。

地上部葉斑病較普遍，可用六百倍的水銀波爾多液或一千倍的富美隆（Fumilone）液噴布。

土壤中之線蟲可用毒線蟲（Fumazone）處理，每十公畝用藥量為一·五公升，於播種前十五天全面施用。

## 樹鐵黃一周希

雲鐵樹為雌雄異株，原產暖熱地，俗名鐵樹難開花乃我國寒冷地區之現象，蓋因氣候寒冷非特難開花，即生長亦不易。

鐵樹適於適潤之砂質壤土，在本省晒。鐵樹即蘇鐵，其繁殖方法：（一）採取種實而行播種法。（二）掘取分蘖而行栽植法。（三）採取幹株而行插植法，均可成功。

過分水濕則有腐根之虞，但過分乾燥發育亦不良。喜日光照射，肥料可於一、三月旬與七、八月間各施一次。