

殺草劑

香蕉園殺草劑
眼萌芽前施用

【問】：(一)「殺草劑」對香蕉株有無損害？(二)什麼牌子的「殺草劑」對香蕉園的雜草功效最好？
【答】：(一)「殺草劑」對香蕉株有無損害，和不必動草就噴施，那個殺草劑且效果最好？(二)屏東城頂鄉方社村舊店路王(二)郎。


【問】：(一)香蕉是葉性草本植物，對殺草劑及反應極為敏感，任何一類殺草劑對香蕉株都會發生藥害。
【答】：(一)目前本省沒有專門用之殺草劑。蕉園使用殺草劑亦限於前施用，香蕉定植後不能再使用，以免藥害。

【問】：(一)一般常見之殺草劑非常昂貴，較廉價之二、四、D則完全不能用於蕉園，否則全園廢枯，因之在本省工資比較下，殺草劑於蕉園似無利益可言。(蔡聰)

養鵝

利用青料養鵝
可減生產成本

【問】：(一)鴨、鵝之青飼料，以何種草或豆料植物較好？
【答】：(一)歐美品種如土洛斯、愛姆登等小鵝何處有售，目前本省有何新品種，體重及產卵數如何？(二)嘉義大林鄉大美里四十二號鄭水木。



【答】：(一)家畜類所用青飼料除了青葉菜以外，藍田拉草、紫雲英等較為幼嫩，牧草類均可利用飼養。而其草苗或種子可向臺南縣新化鎮臺灣省畜產試驗所洽索。

(二)土洛斯、愛姆登及洛曼等，是歐洲的大型鵝品種，可能或淺淺不到該品種，現今臺灣所養的鵝品種是中國種，其標準體重公五、四公斤，母四、五公斤，年產卵數約為三十至四十個左右，產卵季節分春秋兩季。(潘金木)

獸醫

豬隻體內驅蟲
宜交配前施行

【問】：(一)處女母豬懷孕兩個月是否可行體內驅蟲，驅蟲用「牛豬安」或「匹配拉淨」何者較好，用量如何？
【答】：(一)藍田斯母豬懷孕已五十六天，除部經常流涎粘液是什麼原因，外除有時紅腫，但食慾正常沒有發情現象，是否尚沒有配上，從體外各部如何判定懷孕？

【問】：(一)藍田斯母豬配種克夏公豬，所生的仔豬生長情形如何？(臺北縣林口鄉南村二十號陳太郎)

【答】：(一)無論處女或經產之懷妊母豬不做驅蟲為好，驅蟲時期應在交配前實施。所問懷妊兩個月之母豬如確有驅蟲必要的話，應儘量選擇副作用少之驅蟲藥使用為妥，例如驅蟲蟲等綠蟲類時，可用每公斤體重〇・二克之匹配拉淨在空腹時混於少量之飼料內與食即可。

【問】：(一)懷孕後陰部經常流出粘液之原因有許多，例如陰道炎，子宮頸管炎等，管理上應特別注意環境衛生，尤其豬舍之清潔乾燥及外陰部之清潔方面加以留心。

配種後已過五十六天，外陰部有時紅腫，但食慾正常，而沒有發情現象，據記述推測，是否環境衛生不良所致，或有蚊子所致，如果無定期性紅腫而其發情較正常發情為輕且時間為短的話，一般稱為中間發情，即有正常懷孕。

配種後二個月之體外部妊娠診斷可注意乳房，乳靜脈之發育，乳頭附近之變紅，早晨未採食前之腹圍增大，食慾增進，不喜激烈運動等，最好能每週在空腹時測量體重，其體重每次有明顯增加，將可認為懷孕，但對不溫順性質的母豬不可做，以免發生流產。

(二)藍田斯母豬配種克夏公豬所生之仔豬生長，如有良好之飼料及管理的話，非常良好。要詳細資料可向竹南糖種畜場索取。(李永基)



一代高冷地區甘藍慧星 豐富一號甘藍

敝行為謀求高冷地區發展，數年來費心不斷試驗淘汰業已受高冷地區農友一致好評，該品種具耐寒，抗病力強，極容易栽培，每球三五公斤，結球後可放置體場七八十天，不腐爛，耐運輸，最宜外銷。惟恐農友受劣種所累，致於本年改原封進口(十磅裝)，敬請認明標示臺灣總經銷處新合成種子行，以免誤購為幸。

●天理交配 日本大和農園產品
●經銷處 大和一號甘藍、小玉西瓜、ニユーメロン甜瓜、金城甜瓜、金力甘藍、精王西瓜、巨豐菠菜、ミカサ菠菜、長岡交配タキイ種苗株式會社各品種現貨供應。
●美國加州大甜椒 (366) 結球高莖、西洋芹菜 619，其他品種均齊備。

新裕興企業股份有限公司
成種子行

臺北市迪化街二一四九號
電話：五四三二七八七號
臺灣郵政劃撥五〇二號

吊絲蟲 剋星出現了！



強力

全滅靈乳劑

一品乳劑



正豐農藥

正豐化學股份有限公司
電話：霧峯63