

# 怎樣提高嘉南地區水稻後作秋季甘藷栽培利益？

春永羅 · 德武陳

嘉南地區的秋季甘藷種植面積，五十六年為七萬一千四百一十七公頃，其中，於第二期水稻收成後種植的，約佔七三·二%之多。這種水稻裏作甘藷的栽培，多在十月下旬至十一月上、中旬，中間作和第二期作水稻收成後整地作畦種植，畦寬約一百至一百二十公分，畦高約三十五至四十公分，株距約三十至三十五公分，每公頃種植株數約二萬五千至三千株，因為種植株數太少，又於種植後氣溫降低，季節風強，以致生長緩慢，需至翌年五、六月方能收穫，栽培期間達六、七個月之久，而且收穫時適遇雨季，塊根常常腐爛，並無法曬晒甘藷，因此，不論從土地利用、收穫方便或農家收益等各方面來講，都有加以改善的必要。經試驗證明，採用改良糊仔甘藷栽培法，除了甘藷外，又可在春季多種一季花生、芝麻、豆類、玉米、黃麻或高粱等作物，不但能提高當地複種指數，更能增加農民收益。

## 甘藷品種和藷苗的選擇

糊仔栽培用的甘藷品種，選擇早熟和耐寒的。目前臺南地區可採用新竹一號、紅心尾或烏屎種等。藷苗應事先設置採苗圃，採取優良的先端苗，同時藷苗不可太長，約二十公分者為佳。

## 移開稻株和糊植的工作

(1) 移開稻株：水稻插秧後三天內，每隔水稻三行，將第四行水稻移栽於鄰近的株間，保留第四行為空行，以供栽植糊仔甘藷之用。水稻的移栽時間越早越好，以免影響水稻的生育和收量。或者於水稻插秧時將第四行的稻行留為空行，並將該行稻株直接插於兩邊稻株間亦可。但移開稻株或保留空行時，應採用寬行之列，以利將來甘藷生育。

(2) 準備糊仔用甘藷畦：於第二期作水稻最後一次除草同時，在預留的空行間，作成高六公分，寬十公分的種植畦，以供糊植甘藷。

(3) 糊植時期和方法：甘藷糊植時期約在九月上、中旬（白露前）為宜。甘藷苗於水稻收穫前四十至五十天，以水平淺植法糊植在預先準備的畦上，株距約二十一公分（七寸）。藷苗糊植後，田間之澆水工作，應注意不要澆到糊植畦上，以免引起藷苗腐爛。

# 台

品質保證！

# 藥

△ 50% 大	△ 25% 菜	△ 50% 菇	△ 24% 快	△ 50% 特製加保	△ 10% 特製 DDT	△ 25% DDT
減速	立淨	菜寶	殺乳	利水和	粉劑	乳劑
農藥字 〇七三一號	農藥字 〇六七三號	農藥字 一三〇七號	農藥字 一三〇九號	農藥字 一三八七號	農藥字 一四〇五號	農藥字 〇四七五號

# 裕

強力！特效！

# 農

廠工化業農司公限有份股業企台裕

號四四〇三話電 號六二一路西華中市化彰：址廠

號四十六路陽衛市北台：司公總

牌卦八 註冊商標