

炸，山坡地每公頃二百株至四百株。  
飼施肥：蔗竹集約栽培，一般每年每株用尿素一·八公斤，過磷酸鈣三·〇公斤，氯化鉀一·二公斤，矽酸鈣二·六公斤，分三次施，三、五、七月或五、六、七月，凡雲林嘉義可五月開始，因降雨較遲。新種（第一年）施肥量可減一半。

（四）綠竹育苗法：掘取竹樓內一年生幼苗，實行栽植，幼竹之留存，係在秋季白露前後，將健全竹筍留存任其生長成者，每樓可留四五株，約四月初掘取，實行栽植。（江灣）

### 麻六甲木材用途多

【問】：麻六甲樹材的用途伐期如何，種苗何處可得？（苗栗公館鄉中村隘寮街一三三號郭煥章）

【答】：麻六甲合歡，原產麻六甲自民國十七年引進臺灣。木材色白、輕軟，適於做箱板、合板、火柴、造紙等用途。

近年中南部推廣之幼年株甚廣，因其生長迅速，伐期短（主伐十二至十五年）。用直播或植苗造林，苗木請向苗栗縣政府林務課申請，種子可向嘉義市光華路十五號瑞峯行查詢採購。（江灣）

### 護保物植

#### 預防鳥脚病

#### 土壤先消毒

【問】：（）我種了二分多地蕃茄，不幸患了鳥脚病，皮變黑而後腐爛，要如何防治？

（）另有一種心尾懸擔，據說是發狂病，如何防治？（嘉義水上鄉大崙村六十九號李文課）

【答】：（）所謂鳥脚病又名萎凋病或立枯病，係一種真菌類寄生所引起。

預防方法於種植前選用施美濃乳劑一千倍，收到生乳劑一千倍，或克壤土乳劑六百五十倍等，先行土壤消毒。  
如於前期發現病徵可立即噴用上列前二種藥劑，處理根際部份。蕃茄如於發育中後

期感染此病，請拔除病株以防傳染。目前尚無防治方法。

（二）所謂發狂病原名嵌紋病，為毒素所引起，本病無防治藥劑，宜於植株發病初期防除野蟲類等媒介昆蟲。病徵出現後宜拔除病株，減少傳染機會。（陳慶忠）

#### 介殼蟲防治法

【問】：梅樹頭部及枝條，均染患類似白粉樣，此種病害繁殖非常快，後即現枯死，經使用美達松滲夏油使用，尚未見效果，未知此病屬何種病蟲害，該用何藥物防治（附標本）？（南投國姓鄉南港村林茂修）

【答】：林農友所問有關梅樹病蟲害一函，據附寄標本鑑定結果，為感染介殼蟲所致，防治：（一）五〇多馬拉松八百倍液，九十五公升中加入九五多高級夏油一公升，（二）五〇多大滅速一千倍。（三）二十五多福木松一千倍都有效果，唯使用藥劑應常更換，不宜一種藥劑經常使用。（蘇鴻基）

#### 落葉病蟲防治法

【問】：落葉病害如何預防，治療法如何，請由種子、土壤之消毒以及殺蟲殺菌等，依先後次序說明之？（臺南市白強街二十四號何武明）

【答】：（一）選排水良好的砂質壤土、砂質土、壤土等，栽培落葉為宜，若土質過粘或陰濕的土地均易發生病害，尤以腐敗病發生為烈。

（二）選無病，莖頭為種球，例如黑球病、赤索病、種球均忌，一般農友所種的種球以自留為多，故宜選擇水良好的土地設置探種圃，在生育過程嚴密淘汰毒藥病株，同時定期噴藥防除野蟲等，藉以繁殖健全的種球。  
（三）採種圃所採的種球於貯藏前，使用烏斯普龍一千倍稀釋液浸漬一小時，然後再用清水沖洗後栽培。

（四）若種球向外購入，需除去腐敗種球。並於栽植前乃用烏斯普龍一千倍稀釋液浸漬一小時再用清水沖洗，然後定植。

世界最新發明 新構造 携帶輕便 最新型高壓動力噴霧機出現了！

## 丸山牌手提式動力噴霧機

### 構造規格

- 型式：丸山 PS-080
- 淨重：拾公斤
- 動力元：川崎二衝程發動機
- 出力：1.5Ps
- 噴藥能力：8 立
- 附帶藥管：20公尺
- 噴口：丸山高能噴口
- 燃料：汽油 25：1
- 起動方式：自撻式

### 優點

輕便耐用，省油，保養容易，使用簡便，作業能力迅速，效果確實。

### 用途

1. 水稻、果樹、菜園、瓜類、菸草及一般作物之藥劑撒佈。
2. 禽畜舍防疫藥劑之撒佈。
3. 營舍、倉庫、家庭環境衛生消毒藥劑之撒佈。
4. 建築物各種車輛之洗滌。

▲說明書備索，歡迎參觀賜顧▲



製造元：日本丸山製作所  
臺灣總代理：英達貿易有限公司

臺北市中山北路一段33巷23號 TEL: 559866