

因氣候陰濕通風不良的地區，易發生赤銹病，故發病初期宜噴射銹乃浦或錳乃浦四百倍稀釋液，噴藥時須加用展着劑以利藥劑粘着葉部而提高防治效果，一般宜繼續噴射三次始能收效。

因若發生腐敗病、黑球病等，土地不宜連作，應改種其他作物，採用三年輪作。(王進生)

**石灰硫磺合劑 不宜連續使用**

【問】：(一)按柑桔栽培書籍所載，應於本月上旬噴射波美二十八度石灰硫磺合劑加水八十倍，若噴霧器容量為十二公升時，應加石灰硫磺合劑一百四十四西西(cc)，予以噴射，是否正確？

【答】：(一)噴射石灰硫磺合劑之適當時間，間隔次數以及收穫前幾天應停止？

【問】：柑桔腐爛病之防治，可塗銅劑，所謂銅劑是那一種，塗銅劑的效果是否很好，有無其他根治法？

【答】：(一)柑桔栽培書籍所載波美二十八度之石灰硫磺合劑該加水八十倍，就請加水一百四十四西西並無不妥之處，石灰硫磺合劑之比重雖與水不相同，但若採用石灰硫磺合劑時，書本上一定會註明，波美三十三度石灰硫磺合劑，需加水幾倍等語。

【問】：石灰硫磺合劑噴射後一至二週間會損害葉片之同化作用，在二週內不該連續噴射，由石灰硫磺合劑之殺菌及着色促進效果來看，該在收穫前七至十天停止噴射。

【答】：(一)防治柑桔腐爛病藥品中雖有氧化銅等銅類之記載，但效果不很顯明，一般對柑桔腐爛病之防治方法如下：

(1) 注意排水，在雨季時用稻草敷於樹幹基部，以避免病菌附着於樹幹上。

(2) 用利刀切除患部及周圍健全部，

以多穗十克和石灰二百克，加水調成糊狀塗抹切除部。

(3) 切除部過大時，另需根據。

【問】：(一)擬購買產蛋鴨五百隻左右，請貴社代為介紹？

【答】：(一)目前本省所有產用鴨大部份以本地菜鴨及北平公菜鴨之雜交一代母鴨為主，而卵用鴨之繁殖較有季節性，茲介紹礁溪鄉大忠路三十九號張金波孵化場，請向該場聯繫洽購。(二)養鴨之參考書，非常鮮見，中國農村復興委員會曾編印有養鴨小冊，可索閱參考。(潘金木)

【問】：(一)切除部過大時，另需根據之總稱，柳橙、晚雷西亞、臍橙、成金剛、吉發等均屬此類。


【答】：(一)臍橙為一種單為結果之品種。花粉大部份不成熟，不會飛散至印仔柑柱頭上雜交，印仔柑花粉雖略有飛至臍橙柱頭雜交之可能，但只會提高臍橙之著果率而無不良影響，不必改接同一品種。(翁仁祿)

**畜產**

**蛋用鴨繁殖 富有季節性**

【問】：(一)擬購買產蛋鴨五百隻左右，請貴社代為介紹？

【答】：(一)目前本省所有產用鴨大部份以本地菜鴨及北平公菜鴨之雜交一代母鴨為主，而卵用鴨之繁殖較有季節性，茲介紹礁溪鄉大忠路三十九號張金波孵化場，請向該場聯繫洽購。(二)養鴨之參考書，非常鮮見，中國農村復興委員會曾編印有養鴨小冊，可索閱參考。(潘金木)



【問】：(一)分地泰比亞牧草，可養多少頭肉羊？

【答】：(一)養豬與養肉羊那個有利？

【問】：(一)羊肉在市面售價，銷路如何？(屏東縣高樹鄉榮寮村新改路三號賴壽安)

【答】：(一)泰比亞牧草產量因地區與水源供應而有差別，在屏東地區水源充足，一分地大約生產牧草(泰比亞)約在二萬公斤左右，可供肉羊八至十頭一年所需之量料。

(二)養豬與養羊二者性質完全不同，前者飼料成本較高，但所費人工較少，養羊以草為主食所需人工較多，但飼養一羣羊不在此

**羊肉冬季銷路好**

【問】：(一)分地泰比亞牧草，可養多少頭肉羊？

【答】：(一)養豬與養肉羊那個有利？

【問】：(一)羊肉在市面售價，銷路如何？(屏東縣高樹鄉榮寮村新改路三號賴壽安)

【答】：(一)泰比亞牧草產量因地區與水源供應而有差別，在屏東地區水源充足，一分地大約生產牧草(泰比亞)約在二萬公斤左右，可供肉羊八至十頭一年所需之量料。

(二)養豬與養羊二者性質完全不同，前者飼料成本較高，但所費人工較少，養羊以草為主食所需人工較多，但飼養一羣羊不在此

**柑桔肥料**

不須再攪拌  
不會被流失  
台肥柑桔肥料  
促進豐收實滿枝

N - P - K  
16 - 8 - 12



**花卉肥料**

雞糞髒兮兮  
水肥臭難受  
台肥花卉肥料  
清潔衛生頂不錯

N - P - K  
5 - 10 - 8



**蔬菜肥料**

水肥有病菌  
更有寄生蟲  
台肥蔬菜肥料  
無菌無蟲功效宏

N - P - K  
14 - 5 - 5



**瓜果肥料**

種瓜要瓜大  
種果要果美  
台肥瓜果肥料  
能使瓜果大又美

N - P - K  
10 - 8 - 8

