



# 鵝的飼養與管理

潘金木

根據記載，鵝是由野棲的雁類馴化而來，所以至今還有野生鵝與家禽鵝之分。臺灣氣候溫和，河流錯綜，草原蔚綠，正是適合養鵝的好地方，除鵝肉可供食用外，絨羽毛的用途，糞便的肥效價值也不可忽視。另一方面鵝的習性溫馴，體健又耐粗食，容易管理，任何草地都可放養，故是農村的好副業。其天鵝般的外表，更能點綴鄉村的美景，在歐洲，也有利用其見生人即啄食的天性，做為一種警備。鵝對任何雜草都可啄食，所以對開墾地或果園的除草工作，獨具專長。

## 主要品種有三

(1) 杜露斯種 (Toulouse)：法國南部 Toulouse 地方原產的灰色鵝，性情溫馴，嘴橙色，腳濃赤橙色，成鵝喉嚨顯著發達，體軀方形腿短，成熟稍遲，標準體重雄約十二公斤，雌約九公斤屬於大型種，年產卵數四十至五十個左右，卵重約一百八十至二百三十公克，但肉味較淡，筋肉粗硬。

(2) 愛姆登種 (Amdam)：英國白色在來種所育成，橙色嘴，濃橙色腳，全身白色羽毛，肉色淡但風味佳，屠肉率甚高，標準體重雄約九公斤，雌約八公斤，年產卵數約有三十至四十個，卵重為一百八十至二百三十公克，同時體質強健，早熟而耐粗食。

(3) 中國種：中國原產，經美國改良育成，分褐色與白色兩內種，一般有鵝鵝、香港鵝、亞洲鵝以及瘤鵝之異名。雖然體型小，但配偶性高，體質強健，容易飼育，若與大型種雜交可以提高產卵能力及早熟性，標準體重雄約五·四公斤，雌約四·五公斤，通常春季一次二十至三十個連續產卵而就巢孵化，秋季換羽後亦可產卵十至十三個而不見就巢。

。卵重平均約有一百七十公克。

## 育雛方法簡便

育雛方法比鵝的育雛更簡單，分為依賴母鵝照護的自然育雛及人工保温育雛二種，人工育雛可先將小鵝移至華氏九十度保温箱內，孵化後一至二晝夜，即可給喂碎青菜或摻入米糠等煮熟穀類，經三天保温箱溫度可以降至華氏八十度，第五天降至七十五度，第八至十天以後逐漸維持華氏六十至七十度的常溫，而仔鵝強健，生長迅速，所以初生一週內應該給喂五次以上，將飼料調成容易採食的濕餌，俟三至四週以後，慢慢改為一日三次，混有穀類的飼料，但此時必須注意補給少許木炭末，砂或貝殼骨粉。

鵝比鴨發育更快，生後一個月就有一·八七公斤體重，第二個月可達四·五至五公斤體重。

混合飼料配方與鵝飼料大同小異，鵝屬雜食性，故以植物性飼料草類為主，而玉蜀黍、麥類、麵皮以及米糠等混合飼料為副食，將把混合飼料調成濕餌，成鵝一天朝夕兩次喂食，其餘時間可任其啄食草類，一方面可以除草、驅蟲外，亦有施肥之效，農業經營上可說一舉兩得。若是舍飼，應有足夠運動場，同時除混合飼料外，還要添加五十%綠草，因為鵝的味覺，對於粗飼料消化力特別發達。飼料配合百分比如下：玉蜀黍三〇、碎米一〇、米糠一五、麵皮一五、大豆餅一〇、魚粉一〇、貝殼骨粉五。飼料配合例二：玉蜀黍一〇、剩飯三〇、米糠二〇、麵皮一〇、大豆餅一〇、魚粉一〇、貝殼骨粉五。

## 春秋二季繁殖

鵝不比鵝鵝全年性的產卵繁殖，牠有一定限制的繁殖季節，產卵與配種。通常分為春秋兩季，且

鵝的繁殖往往有配偶性，普通是雄一對雌四，如杜露斯或愛姆登等大型種，應以雄一對雌二較好，而中國種鵝則為雄一對雌四。環境的溫度，不良照明、濕度、騷音等，頗有影響，故須十分注意。又孵化日數大約三十天左右（二十八至三十一日）。

## 鵝的利用價值

(1) 鵝肉鵝肉與雞肉成分百分比如左：

種類	成分	
	鵝肉	雞肉
水分	三八·〇	七〇·一
蛋白質	二五·九	一八·五
脂肪	四五·六	九·三
炭化物	—	—
灰分	〇·五	〇·九

即是鵝肉比雞肉水分少，粗蛋白質含量略低，但脂肪含量甚高，如此家禽肉中脂肪含量最高是其特長，又鵝脂與豚脂極可融和。

(2) 卵：鵝卵成分百分比：僅其卵白較濃，適合蛋糕餅菓製造之用，同時鵝卵大，加工調理甚方便。

鵝卵成分	全卵			
	殼	卵	白	黃
水分	一四·二	五九·七	八八·三	五四·一
粗蛋白質	—	一一·九	一〇·五	一八·九
粗脂肪	—	一一·三	〇·一	二五·六
灰分	—	〇·九	一·一	一·五

(3) 鵝糞：每隻每月約有三至三·七五公斤，收量不可忽視，而其肥效成分百分比如下：  
水分七七·一；磷酸〇·五四；有機物一三·四；鉀〇·九五；氮〇·五五；石灰〇·八四。