

農友經驗

蔬菜園應用

殺草劑除草

當我服務於斗六糖廠時，曾在該廠第二農場大量使用除草劑於蔗園，效果很好。最近因有鑒於家鄉蔬菜園的除草請不到工人，遂試用殺草劑於菜園，成績令人滿意，因而願將我的經驗提供給大家做參考，並請各位指教：

蔬菜園雜草種類繁多，殺草劑不是對每一種雜草都有效果，例如二、四-D對於莎草科土香、水竹以及潤葉草都有效果，而對於已萌發的禾本科雜草或鐵線藤，其效果甚微，同時二、四-D藥效短。

而卡滅克斯(Karmex)對於莎草科效果不大，但可殺死鐵線藤，不過其價格較貴昂，如果兩者配合使用，不但可減少卡滅克斯的用量，更能相互發揮殺草效果，既經濟又能增強殺草效果，相得益彰。

二、四-D和卡滅克斯真有強烈毒性，絕不能接觸蔬菜，否則草未除盡菜先死，因此，必須用細粒單噴嘴噴嘴上面固定一個小型燈罩(利用蓄電池燈泡的燈罩)，儘量接近地面噴射畦邊、畦溝底。剛定植不久的甘藍、花椰菜，植株距較寬，畦面如要噴藥，必須距離植株周圍三至四寸處

不能噴藥，所剩的這三寸處的雜草，再用人工來拔除就省事多了。畦面噴藥如發現蔬菜稍受影響，應即注意施肥以防生長受阻。

殺草劑的用量，以氣候、土壤濕度及雜草種類而定，在高溫多濕、土壤濕潤和雜草幼嫩情況之下，藥劑量最省，乾燥的土壤必須先行灌漑才能噴藥，老化的雜草效果不大(如牛筋草、鐵線藤)，如能先行人工拔除再噴藥，其效果最好。普通四十分之二、四-D一湯匙加八十%卡滅克斯半湯匙再加肥皂一湯匙，混合水十五公升均勻噴射，每分地約需四五桶。卡滅克斯係懸浮液，配後應即噴之，久存則沉澱而影響藥效。在烈日之下噴藥約經三至四小時即可顯出藥效。

蔬菜的生長期短促，普通只噴一次即可，蔬菜茂密後雜草就不易生長了。噴射殺草劑並需注意下面幾個原則：

(一)噴藥時間應選擇晴天無風的早上，以防藥劑接觸蔬菜。
(二)如預知四十八小時有降雨可能，應停止噴藥，以免藥劑流失。

(三)土壤疏鬆殺草不佳，最好作鬆後行灌漑，或畦面經雨打而使土粒緊密再行噴藥。

4. 噴藥後表土三四處形成一層藥膜，使雜草不易長出來，應禁止鋤動土壤。

總而言之，噴射殺草劑要配合天時、地利，雜草萌芽初期以前最有效，同時最省藥劑量，如果配合不當就難收預期的效果了。(彰化縣溪湖鎮大竹里彰水路八號之三十徐勝勝)

裕企台有限公司股份有限公司

號四四〇三話電 號六二一路西華中市化彰：址廠
號四十六路陽衡市北台：司公總