

六至十七頁之「日本柑桔計劃密植最新方法」及十四卷二十期十一頁之「盛行日本的柑桔計劃密植栽培」乙文。(翁仁獻)

葡萄用途很廣

南部可栽培

【問】：(一)葡萄銷路將來性如何？

(二)那些葡萄品種適合中南部？

(三)優良母株插枝

繁殖法，將來結果及產量如何？

(四)三至四節插枝

法與過枝法相較，未

來的果味是否一樣？

(臺南縣下營鄉紅溝

村七十二號鄧西漢)

【答】：(一)葡萄用途除酒、生食外，

可絞果汁、製葡萄干、及罐頭等，本省所產

葡萄目前主要用為酒及生食，至於絞果汁

、製葡萄干及罐頭較少，葡萄有許多品種，

品質極好且甚耐運銷，將來銷路，由筆者個

人看法，未來十年內之銷路，可能無大問題

，將來生產過剩時，也可以出口外銷。

(二)在本省中南部可栽植食用的葡萄計有

巨峰、貝利A、巨峰X巨峰、大開號、高砂

、義大利、金齊等，其中貝利A、巨峰、巨

峰X巨峰、大開號、義大利等品種較為適合

栽培。

(三)由優良母株剪下來的枝條，可用插枝

法栽培，假如栽培管理技術合理的話，將來

的結果，產量以及品質等與接木樹相比，並

無差異，但插枝樹對財蟲害是無免疫性的。

(四)三至四節插枝法與過枝這兩種栽培，

將來的果味、品質等均相同，但頭一年的果

味，過枝法可能好一點。(徐金玉)

蔬 菜

苦瓜生瘤心

試用毒線蟲

，何處有傳？

【問】：(一)苦瓜優良品種有幾

種，何處有傳？

(二)苦瓜莖頭會生瘤，是屬何病，須用何

藥方能根治？(屏東縣竹田鄉美崙村龍崗路

五號邱慶文)

【答】：(一)本省現有苦瓜，有粗粒白米

苦瓜及大苦瓜，可向高雄市建國二路二一九

號大豐種子行洽購，郵政撥撥二二八三九號

。

(二)根莖生瘤是根線蟲及瓜蟲為害(莖部

瘤心)，如一根線蟲，可見在結瘤中心有一個

「瘤心」，會發生根線蟲地，最好不連作，在

線蟲發生地，可灌注防治線蟲農藥，省內現

有農藥有毒線蟲，可在播種前十五天，隨意

的加水溶稀注入土中，每公頃七十多毒線蟲

原液十八至二十八公升。D-I-D原液用量為

二百公升，每穴注入深度十公分，注藥時田

間保持適當濕度為宜。(陳培員)

紅辣椒苗床

宜選向陽砂壤土

【問】：(一)紅辣椒籽何處有售？

(二)育苗及施肥方法如何？

(三)為害辣椒使落花而不能結果的一種臭

蟲，用「發文」對該蟲是否有效？

(四)木薯種苗，北部何處有售？(臺北縣

三芝鄉埔尾村四十八號之十劉鹿揚)

【答】：(一)三重市重新路二段三號之一

榮華種子行，有紅辣椒羊角種，每臺兩零售

價為新臺幣貳拾元。

(二)紅辣椒之苗床須選向陽排水良好的砂

質壤土始能育成強健的苗株。每十公畝所需

的播種量約六十公克，(發芽率七十%)將

六十公克之種子條點播於二十平方公尺之間

床，或撒播於二十五平方公尺之苗床，條播

採用行距九公分，粒距三至四公分至本葉一

至二片時，間拔為株距六公分。撒播也同樣

間拔密生苗，使苗株互有六公分左右之行

株距，若有時間於子葉(真葉尚未出現)時

假植一次(不帶土)更佳。富有機質之苗床

其根羣發育良好，因保水力良好土壤通氣且

能保持適濕。苗床每十平方公尺所需的肥料

約如下：

(1) 基肥(腐熟)三十至四十公斤，

硫酸銨〇·四至〇·四五公斤，過磷酸鈣〇

·五至〇·六公斤，氯化鉀〇·五至〇·六

公斤。

柑桔肥料

不須再攪拌
不會被流失
台肥柑桔肥料
促進豐收實滿枝

N - P - K
16 - 8 - 12



花卉肥料

鷄糞髒兮兮
水肥臭難受
台肥花卉肥料
清潔衛生頂不錯

N - P - K
5 - 10 - 8



蔬菜肥料

水肥有病菌
更有寄生蟲
台肥蔬菜肥料
無菌無蟲功效宏


N - P - K
14 - 5 - 5



瓜果肥料

種瓜要瓜大
種果要果美
台肥瓜果肥料
能使瓜果大又美

N - P - K
10 - 8 - 8



台灣肥料股份有限公司第二廠出品

廠址：基隆東明路55號 各地經銷商均有出售