

# 農友經驗



## 省工省時的支架搭法

農友在搭合掌式支架時，常常感到麻煩和不便，就是必須多砍一些長竹桿來接這些支架，而且在接頭的地方，費了很多時間，還不容易用稻草縛得很牢，在這裏，我要介紹一個聯接合掌式支架的新方法：

- (一)先將支架相對的插在畦上。
- (二)再從畦的兩個開端支架交叉點上，各向內插進一根較長而堅固的竹桿，這是為了抵消保麗線的拉力。
- (三)再用一根保麗線，先把開端的三根呈三角形的支架縛牢，再延長保麗線，將靠內一組支架交叉點上，圍繞一圈，拉緊，再引線圍繞拉緊另一組；每組支架便受到保麗線均勻的拉力而牢牢固定住。
- 最後再把保麗線牢繫在最後一組三角架上即可。

用此法搭支架，不但支架牢固得紋風不動，而且在工作時間上，也祇有舊法的三分之一，農友不妨試試看。(桃園縣桃園鎮成功路二段二巷四號張鳳興)

## 稻田裏作豌豆

去年農曆十月上旬，我在晚稻稻田試問作四厘地的豌豆，結果非常成功。自那間作豌豆的稻子收割後，我

常忙著將其除草、施肥、灌溉……，就像照顧子女般地看待它們。由於管理週到，田裏的豌豆長得非

常茂盛，現已開花結莢了。此後我常利用閒空之際，到豌豆田裏欣賞自己以汗珠所得的結晶品，望著結莢纍纍的豌豆；內心充滿無限喜悅，使我深深地領悟到：唯有努力才有收穫的銘言。茲願將我在晚稻田裏作豌豆的方法及管理經驗，略述於下，以供本刊農友們作參考。

(一)播種：利用晚期作的稻田，選塊較砂質且管顧較週的稻田，在收割前十五日，以每四行稻株播種一行豌豆，播種時田間略潤潤為宜。

## 仔豬提早離乳的方法及好處

一般農友養豬時，對於哺乳豬的離乳，往往都在三十天後才開始離乳，却在離乳以前，都用甘藷葉來教槽，這實非理想之法。現在要想豬隻快長大，最好應使仔豬提早離乳。

(一)提早離乳的方法：在母猪分娩一個月前，給與母猪餵食飼料，以提高胎內乳豬的發育，而分娩後繼續給與種豬用的飼料，到了第十二天哺乳，豬就開始教槽。用完全混合飼料來教槽，這樣可促進發育，防止教槽這段期間發生白痢，而使乳豬發育受到阻礙。

要教槽時，豬舍隔為兩間，一間放教槽的飼料，一間關母猪，使乳豬能利用在運動時間去舐飼料，口渴時自然的會去吸母猪的乳，而不致發生口渴。這樣慢慢地教槽，等到能吃半飽時，開始離乳，這樣用飼料來教槽，又能節省時間，又有高熱能的營養分，乳豬生長也能迅速，發育正常，直到六十天要出售時一定超過三十斤。(平均每一頭)

(二)提早離乳的好處：(1)母猪在哺乳期間，因受到

(二)播種方法：將所種那行兩旁的稻子撥開，用小桶子以每七寸距挖個小穴，然後每穴放入種子兩粒，以防缺株。播種後，再用微薄的田土覆蓋即可。

(三)稻子收割後，應即將稻草撥開，並用鋤頭將每行豌豆兩旁的稻草頭及雜草順手鋤去，並將每株豌豆旁鋤鬆，然後施下適量的腐熟堆肥，每株施堆肥一壘斤，以環施為佳。同時也可施用少許的三要素肥料做為基肥，用鋤頭培土後，再將稻草鋪蓋兩行豌豆之中，以利保持水份，且可抑制雜草叢生。

(四)生長期中：若逢久無雨水時，應以每星期灌溉一次，若逢久雨時，應需徹底排水，以免影響豌豆的生長

。開花前，應插立支柱以防倒伏。  
(四)開花結莢時：有種青蟲為害豌豆莢部，應用較低毒的「魚藤精」乳劑八百倍液，同時混合微量要素「施葉養元」四百倍液噴洒防治效果倍加，這樣一方面可殺死青蟲，另一方面可促進提早開花結莢。

(五)稻田裏作豌豆的好處：①能充份利用土地②省時、省力③能提早收穫，若多量栽培者可賣得較好的價錢④豌豆收穫後，其莖又可做為綠肥，將使稻田更加肥沃，一舉數得。

以上是我在稻田裏作豌豆的真實過程，諸位農友若有更好的間作方法及管理經驗，盼望能來信批評賜教，我定甚為感謝。(花蓮富里鄉東里一百號黃新發)

臺中縣后里鄉 周伯義  
市北村十五號

乳豬的吸乳的關係，母猪易營養缺乏，身體衰弱，甚至發生乳房炎、關節炎等病，所以提早離乳時，能使母猪不致發生營養缺乏衰弱的現象，且能防止各種疾病的發生。

(2)提早發情：母猪從分娩後，一直用混合飼料飼餵，這樣可供給母體直接所須的營養，又能供給給生殖機能發育所須的營養，以促進荷爾蒙的生成，使母猪在離乳不久後便又開始發情，到過期即可交配。

(3)提高農友收入，由於提早離乳的關係，又能提早發情，提高生產率，就可以增加農友養豬的收入。  
(四)試驗的結果：我在家裏養了兩頭母猪，相差一星期配種，我從母猪配種時以較好飼料餵，到了分娩後期一個月，開始用母猪生產期前的飼料餵，到了分娩時，先交配的母猪所生下的乳豬每一頭都均勻一樣大，而在這一星期內沒有用飼料餵，而後產的這頭母猪，從分娩開始，就用飼料餵，這相差一星期的乳豬，到了十五天離乳時同樣大，而體長頭游皮膚微紅，在離乳這期間，我用教槽飼料餵，到了六十天出售時每頭平均三十斤重。