棗子（中國棗），別名大棗或刺棗，一爲印度棗別名滇刺棗，兩者學名不同，其最大區別爲棗子葉背光滑無毛，印度棗葉背密生柔毛。印度棗適於熱帶區域栽培，在臺灣南部已成爲經濟果樹，棗子則爲溫帶性果樹，我國北方栽培甚多，來園所稱「黑棗紅棗」當係指棗子而言，（黑棗紅棗爲加工上之名稱）棗子早已引入臺灣，在各地栽培，生長尚佳但結果則不好，高冷山地亦曾試植，成績亦差，因棗樹喜乾燥氣候及石灰質之沙壤，臺灣雨量過多，爲開花結果不良之主要原因。此種果樹，可以少量試栽，但不宜多植，苗木在員林一帶苗圃均可買到，距離須六至八公尺。（黃炳臣）

蔬菜

蕗蕎栽培品種 大球大溪苗栗

【問】：(一)現蕗蕎品種有幾種？

(二)每分地種多少？

(三)蕗蕎價格如何？

(四)管理及病害如何？

(五)二期水稻跡地，種蕗蕎是否適合？（嘉義縣水上鄉水上村店子后六十一號蕭昆山、雲林縣水林鄉農會陳登霖）

【答】：(一)現本省各地栽培品種有大球種、苗栗種、大溪種、蘭陽種等品種，大球種和苗栗種是大球品系，分球性中等，麟莖品質優良。大溪種和蘭陽種是小球品系，分球性旺盛，葉部纖細，麟莖品質優良，目前都是小球種。

(二)每分地種球量，種球購買處，栽培方法等請參照本刊第十八卷二十期農業信箱。

(三)去年十至十一月栽植時期之蕗蕎價格爲每臺斤十五至二十元。

(四)蕗蕎病害有銹病、黑斑病、露菌病等防治方法使用「大生M-二二二」四百倍或「水銀波爾多液」噴射防治。蟲害有葱蘭馬於乾燥高溫期發生多，可使用二十五%D.D.T乳劑防治。

(五)二期水稻跡作蕗蕎是適當。

草蝦

池塘養草蝦 不必常換水

【問】：(一)五十八年農曆書，「草蝦養殖」乙文中，草蝦苗放進池塘後，須幾天通水一次？

(二)飼以何餌？

(三)飼以魚市場的水魚是否可以？

(四)何處有售蝦苗，價格如何？（嘉義東石鄉型厝村二十五號蔡昆輝）

【答】：(一)草蝦苗放進池塘後除池水有變壞現象外不必常換水，因換水會使池中的藻類及浮游生物減少，缺乏天然餌料可依池蝦成長，增加投飼，因池水容易變壞，故須視水質良否，約一至二週通水一次。放養密度大的集約養殖則須每天通水一次。

(二)飼養的飼料有植物性的花生粕、糠類、大豆粕等但動物性的螺類，貝類較好，用什魚須選脂肪少而新鮮者。稍爲切碎後投飼，鮮度不良者須用滾水略燙後投飼。

(三)用魚市場的水魚大部份鮮度都不大好，故須煮後才使用爲宜，水魚的種類很多，須選脂肪少且含有什蝦及蝦蟆者爲宜。

(四)宜蘭、雲林、嘉義、臺南、屏東、沿海漁村都可買到，目前東港鎮、鹽埔地方，每尾爲五角（冬苗）秋苗爲一至二角。（黃丁郎）

農藥

有機磷農藥解毒法

【問】：(一)有機磷劑農藥不噴及身上，是否會致人於死？

(二)有何預防方法？

(三)中毒症狀如何？

(四)在山裏（交通不便）有什麼特效藥品可治療？

(五)藥品在什麼地方可買到，以便急需？（臺中縣和平鄉南勢村和興巷一號傅進卿）

【答】：(一)有機磷劑噴射於人體上，其藥液能經皮膚滲透到體內，如達致死藥量，例如巴拉松原體爲五百毫克可致人於死，一



本社啓事

訂戶來函查詢有關訂閱事項或申請更改地址時，應請填寫訂戶編號（寄刊名籤上面編號），以便辦理為荷。

豐年社啓

三角牌

經濟部商品檢驗局檢驗合格

農林廳農肥字第〇〇一四號登記

品質 保證

料肥合綜

!!!品補大的物作農

便簡用施 料肥狀粒
壤土良改 久持效肥

、矽、鉀、磷、氮是
品製合綜的鈣、鎂

省錢！ 省力！ 省時！

永合發化工廠出品
台北市武昌街一段六十九巷九號
電話：二五七二·五六五七四三