

大胡瓜  
小胡瓜  
甜瓜  
越瓜  
絲瓜  
四季豆(嫩豆)  
真豆  
毛豆

臺中白瓜，臺北交一號，豐原青。  
立秋，松風，四葉。  
黃金瓜，新甜瓜。  
青皮，青縞，白皮。  
米管，長筒種，竹竿種。  
白仁衣笠，臺北交二號。  
白皮花仁種，白皮紅仁種，紅皮黑仁種，青皮黑仁紫尖。  
十石。

(2) 利用PE塑膠布共同育苗：PE塑膠布在農業上的用途極為廣泛，從土壤改良、作物種植、覆蓋、灌溉、包裝等都可利用。每年六至九月，為中部地區雨季，且又有颱風侵襲，增加一般蔬菜苗圃管理無限困難。此時如能利用PE塑膠布共同育苗，不但可調節日光、溫度、養份、水份，防止颱風豪雨侵襲，使幼苗得以順利生長，又可節省勞力成本，實可收一舉兩得之效。直播蔬菜亦可利用隧道式PE塑膠布棚栽培，以防颱風豪雨為害。至於PE塑膠布棚蓋方式，請參閱本期第十三頁李樹泉先生專稿「夏季蔬菜育苗PE塑膠布應用技術」。

們參考：  
葉菜類、夏季根羣生育弱，整地宜深，多施堆肥，並加施石灰，以防石灰缺乏之症。經常保持土壤濕潤，以免根羣深入土中，遇積水時，根部溺死。葉菜類生育期較短，應注意追肥施用，嚴防軟腐病和黑腐病發生。  
根菜類：注意基肥施用，並多施鈣肥，提高產量。夏季根羣吸肥力弱，可以葉面施肥方法施用尿素。遇豪雨後注意排水，不可有積水。  
花菜類：應育成強健幼苗。可利用PE塑膠袋育苗，以縮短生育日數，並補充石灰和硼素，以免引起生理病。  
果菜類：早期設立支柱，以免颱風侵襲時遭受嚴重損害。夜間溫度過高地區不宜栽培，以免影響授粉率；最好選擇晝夜溫度差異較大地區栽培。豆類應在播種前灌溉，使土壤保持濕潤。播種後立即灌溉，種子容易腐爛。多施磷鉀肥料。暴雨後即行排水。如遇植株生育不良時，可酌施氮肥，以期恢復生長勢。  
(4) 使用低毒性農藥：嚴守「防重於治」的原則：夏季蔬菜多屬短期性，所以防治病蟲害時，應使用低毒性農藥，以免妨礙個人與購買者的健康。再者，應嚴守「防重於治」的原則，使防治效果顯著，提高收益。



# 生維質

內含家畜需要各種

養份，故被稱為

「最元善輔助飼料」

常常使用


方便 可靠

必能使您賺大錢

新島農牧有限公司

台北市中山北路一段53巷1號

敬啟



(即吉林)場市發批菜蔬