

寶作連 開根素

增收關鍵在開根

性根爛 病熱稻新 防治法

第一期水稻自播種期，即常見黃萎萎等情形，一遇霜寒即凍死，未凍死者亦不易長大（其他植物亦然），一般農友均誤認為稻熱病而噴灑水銀劑或西藥生石灰；不但不能治癒，反而致死。拔起來看其根部即變成黑而爛，這是土壤中缺乏錳素與硼素，致使發根不良與葉面呼吸困難所引起之萎縮病。

這種情形時，請用「連作寶開根素」即可治癒

用法如下：大噴霧器一桶水十五公斤，開根素八公克（五），尿素二兩，三日噴灑一次，三次即可恢復，如同時摻水銀劑噴灑，效果更顯著（水銀劑之用量是普通防治稻熱病之半量為宜，否則形成水銀置換現象，使錳素脫離，其病狀更加厲害）

其他各種農作物之萎縮病與霜害亦可用此法防治，平常五至十日葉面噴灑一次，對於增收貢獻更大，殊對結實植物增收效果最大。（45公克裝批價15元）


天力化學工業股份有限公司
臺北縣中和鄉中山路41之14號
電話：966016 郵政劃撥5179號

使用農藥時摻本品可防治各種農藥無法防治之不知名病症，並且可加速恢復病弱現象，平常向葉面或根部噴灑均有強烈之開根作用。

（偏僻地區請到郵局利用郵政劃撥儲蓄金5179號匯款採購送貨郵費本公司負擔安全迅速方便無論一包二包無任歡迎）

萬病之源在根弱

即留主枝、第一側枝和第一朵花下的第二側枝，使伸長成爲角度約略相等的三幹，再立支柱，以防被風吹倒。如此整枝，陽光照射充分，且能防止肥料浪費，着果增加，品質提高，尤以長茄類，因結果部位提高，果實



茄子的分枝性和開花順序

磷酸對根部的發育和分佈有關，如果施用過多，果皮硬厚，種子成熟提早，果實色澤不良，品質降低，所以以少施爲宜。通常只在施用基肥時使用磷肥；追肥則以氮肥和鉀肥爲主體。

注意病蟲害防治

夏季溫度高而濕度大；病蟲害甚爲猖獗，所以

磷肥用量不宜多

不着地，較少有轉出現象。

畦寬	弓高	桂竹片長度	桂竹片寬度	桂竹片間隔
二·一尺	一·〇尺	五·二尺	二·〇公分	二尺
三·二尺	一·五尺	六·〇尺	二·五公分	三尺
四·八尺	二·七尺	九·〇尺	三·〇公分	三·五尺

應切實按照下述方法防治病蟲害：


(1) 勵行種子消毒和土壤消毒，預防褐紋病、立枯病和地下蟲害發生。

(2) 在夏季，小綠浮塵子爲害很嚴重，宜噴「賽文」八百倍液防治。

(3) 對於紅蜘蛛和酸漿龜蟲，宜噴一八·五%「開路生」可濕性粉劑五百倍液防治。

(4) 蚜蟲可傳染病毒病，宜噴五〇%「馬拉松」二千倍液防治。

(5) 綿疫病和褐紋病等，宜噴四一六式石灰波爾多液或「大生七八」可濕性粉劑四百倍液，並除去病株病果。



條開的小大架竹和寬畦