是把乾草卸下來的工作。

這時候在貨臺底上放置二條大繩，把先端固定。然後裝載乾草，大繩的另端必須露出在乾草上面。這樣地把車後退到畜舍，將大繩頭繫結在畜舍後面的柱上，然後把車前進，所裝載的乾草便可一次簡便地卸下去。（羅基譯自「家の光」二月號）

美國增產火鷄

火鷄在美國目前只在感恩節及聖誕節時期大量供應，但是將逐漸會變成周年性的家禽生產事業。

最近在超級市場的冷凍食品部門，已經常的出售冷凍火鷄供主婦採購。加州大學家禽系主任威爾森認爲，火鷄應在良好的條件下實施室內飼養，給予充份的光線和適當的溫度，這樣才能維持周年的供應。

家禽學家正在研究設計最好的火鷄飼舍，培育什交品種，育成多產火鷄及實施人工授精技術，這一切的工作，都是朝向大量生產火鷄的目標而努力。（德超譯自 USIS Agr. Notes）

增進冰箱的效用

大多數家庭的冰箱，還能發揮更大的效用，這是美國俄亥俄州立大學家政推廣專家露依絲小姐的研究結果。

研究的結果顯示，只有少數家庭曉得冰箱中目前存有那些食品？只有四分之一的農村主婦曾記錄冰箱的內容，而都市主婦曾做記錄的則不及十分之一。

有兩個手續可增進冰箱的效用，第一是經常做記錄，以免忘了曾放過什麼東西？其次是要填明日期，以便先食用儲藏最久的食品。

要充分利用冰箱的空間，首先將基本食物如肉、蔬菜、水菓之類放在堅固的架上，然後如尚有空位再放進麵包、剩菜、點心等物。

像麵包之類的簡便食品，所佔空間較大而又不耐久存宜儘快清理，最久不要超過一星期。（振鵬譯自 Prairie Farmer 1968）

青貯玉米品種

酪農無須選擇特別適合於製造青貯玉米的雜交品種，最好種植產量最高的雜交玉米品種，這是美國伊利諾州立大學乳牛專家胡來爰的建議。

事實上，你可以像種植供採粒用的玉米一般，在相同的時期，用同樣的比率，施同量的肥料來種植供製造青貯用的玉米。用相同的方法管理作物，然後割取可供青貯的部份填塞青貯塔。

要把玉米的成熟時間牢記在心，每莢畝的乾物質和養分隨玉米的成長而增加，直至玉米到達生理成熟。眞正的成熟時期，似乎對乾物質的可消化性沒有多少影響。這種情形和豆科植物不同，如紫苜宿當成熟時，其乾物質的可消化性急速下降。

當玉米成熟時，乾物質隨着增加，穀粒佔最大的部份，因此每噸青貯玉米的能量也大爲提高。當穀粒凹陷，葉子呈黃，就是每莢畝飼料養分最高的時候了。（朋吾譯自 Prairie Farmer 1968）

照顧乳用小母牛

要有適當的飼料和第一流的管理，才能育成理想的母乳牛。小母牛發育中最重要的一段時期是從出生到滿一歲，在這一段時間中應該供給小牛充足的高品質飼料。

美國伊利諾大學乳牛推廣專家詹森，提供了一些建議，他認爲一歲以下的小母乳牛，不可能單靠粗料來吸收所需的營養，必須飼些穀類。

三個月以下的小牛每天要喂五磅的優良初飼糧。有一種優良的精飼料是由下列諸物配成，包括四十磅玉米、二十五磅燕麥、二十三磅大豆餅、八磅糖蜜、二磅磷酸鈣、一磅微量礦物鹽，最好能加上一些抗生素和維他命甲及丁。

小牛滿三個月後，可逐漸減少乾的初飼糧，而增加生長飼糧的份量。詹森說，在這一段時間，小牛可飼喂相當量的優良粗料，做爲營養的主要來源，所以只需要簡單廉價的穀類混合物。

小牛要吃足夠的穀類，使其生長迅速但不致於長的太肥，專家建議四個月大的小牛，每百磅體重每日可喂一磅穀類。

滿週歲的小牛，依靠牧草或其他優良粗料就能獲得迅速的生長。（新年譯自 Prairie Farmer 1968）

MINOC
SUBSIDIARY OF
ROHM AND HAAS COMPANY | PHILADELPHIA
新口進新！裝包
八十七生大*
●壹公斤法國原裝●
農林廳農藥登記證第五八九號



ROHM AND HAAS
PHILADELPHIA
PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 19105 USA
*大生二十二 美國三磅原裝
省農林廳農藥登記證第一六一號



現貨進口經銷商：
一、裕臺公司農化廠：彰化市平和里平和莊五十號
二、惠光貿易有限公司：臺南市東門路二三一號
三、群英公司：台北市南京東路二段一〇九號三樓
四、英明貿易有限公司：基隆市鄭政信箱八六號
五、福農公司：臺北市漢口街一段五十七號二樓
臺灣總代理：
青象貿易有限公司
臺北市漢口街壹段壹肆肆號柒壹壹室
電話：三三六一七七
■說明書函索即寄
*美國賓州費城羅門哈斯公司登記商標