

植類果樹適宜溫度為〇・五多，每年噴佈次數可視果樹發育而定，噴佈過多則枝葉茂盛，影響開花結果，一般以間隔三十日左右為宜。

(一)最好不將農藥與肥料混合為原則，如必須同時噴佈者，應避免將極性農藥或肥料混合於有機性肥料。

(二)印度葉面噴佈尿素可在七、八月及果實生長期噴佈，以助樹體及果實生長，唯肥液噴在果實上有使果皮增厚之可能，此點將送請專家試驗。

西印度葉面噴佈時期，最好在二月三日深果完熟以後。

西印度葉面噴佈後或活率很高，如有時間預先剪根及再行修剪更好。(曾錫恩)

菜蔬

本省栽培可椰子

含油低經濟價值少

【問】：可椰子有那些品種，適宜什麼土質及氣候，坡地是否適合種植？(臺北縣五股鄉德善村一鄰四號林重勝)

【答】：可椰子適合在赤道南北緯十度以內，無寒風地帶栽培，臺灣北區不宜種植。過去本省所種植之可椰子，椰肉(Copra)中之含油量祇有一、二十%，祇正常含油是(六十%以上)，相差甚遠，無經濟價值。(張振市)

多施氮素肥料

減少白菜開花

防治鹹好？
【問】：(一)包心白菜軟腐病，用何藥劑？(二)在本地(曾文區)冬季播種長岡交配二號包心白菜是否有抽苔之虞？(三)長岡交配二號包心白菜，在何種環境，不易抽苔？

【答】：(一)對於軟腐病植株，最好立即拔除焚燒以免病菌蔓延，目前尚無特效藥劑，一般用養撲丹四百至五百倍防治，但效果不顯著。

(二)依該區冬季溫度變化推測，當不致有抽苔之虞。

(三)攝氏十度以上環境，不易抽苔。因多施氮肥，增加營養，可減少開花，土壤經常保持濕潤勿使乾燥，亦可減少開花。(丁俊傑)

洋香瓜值得推廣

【問】：露地洋香瓜臺南一號種子，何處有售，自播種後多久可收成，銷路如何？(雲林縣東西鄉瑞村三號林連春)

【答】：如要少量試種露地洋香瓜，臺南區農業改良場有一「臺南二號」種子贈送，可向該場索取。

露地洋香瓜自播種到收穫需約四個月：秋季約三個月。

露地洋香瓜目前只有肉銷，而且銷路並不很普遍，故在還沒有確定銷路之前，暫不要栽培太多。

每分地收量約一千五百公斤左右，每公斤批發三至六元不等。(施銀行)

豬養

在來母豬宜配藍瑞斯約克夏

【問】：本地母豬配杜洛克公豬，雜交一代留作母豬好嗎？

【答】：(一)本地母豬配杜洛克公豬，雜交一代留作母豬好嗎？(二)藍瑞斯公豬配本地母豬，一代母豬再配藍瑞斯公豬，留作母豬可否？(屏東縣高樹鄉榮泰村新沙路三號賴壽安)





【答】：(一)勿論什麼豬種均會患肺炎，但按實際情形本地種肺炎發生率確很高而不易治療。本地豬患肺炎之情形多是慢性經過，開始時雖有點體溫，但食慾照常，因此一般飼養者，若不注意即不容易察覺，病勢慢慢加重至呼吸急促促因難食慾廢絕時，已變成極嚴重醫治很困難。肺炎之預防當然要注

意結合之衛生，常常洗刷消毒消除病原，保持乾燥，注意氣候急遽變化，保溫等，並飼料中加歐羅肥或肝油等等，預防發生為要。

(二)本地母豬配杜洛克公豬之一代雜種，其成績不甚理想，應配藍瑞斯或大白豬(大約克夏)成績較好。

稻飛蟲起星 葉下兩側 噴霧頭



日東牌

動力噴霧機 NDM-37B (新型)

- 特點：
- 1.任何濕度之粉劑均能齊全噴射
 - 2.可耐久工作之引擎，排氣量37cc
 - 3.超輕量8.5公斤


誠徵各地經銷商



高壓動力噴霧、灌水兩用機

- 1.超輕量8公斤
- 2.用單相1馬力馬達

- ▲本公司備有東海印ビニルホース每丸100m及自製各種特殊噴頭。
- ▲本公司可負責包辦菜園之噴霧及灌水配管工程。



空中旋轉撒雨器

日本株式會社 臺灣總經銷

日東製作所 三易行有限公司 臺南市公園路179號 電話 25810

HS-5