

毒疫苗好的問題，目前還議論紛紛。本人認為，目前在本省供應的各種死毒或活毒疫苗，都安全而效力可靠，那麼，活毒疫苗好或死毒疫苗好，那就要看自己飼養的是蛋雞或肉雞，飼養的規模如何，養雞環境是否良好，或是雞羣慢性呼吸器病病原體（P.P.L.O.）的污染程度如何而定了。

環境衛生和管理良好，平而大規模飼養蛋雞和肉雞時，為節省人力並避免因接種而引起的困擾，宜採用活毒疫苗。

籠式飼養的蛋雞，為使每一隻雞均能產生可靠的免疫力，以採用死毒疫苗較好。

使用活毒疫苗時，雞羣如有感染慢性呼吸器病之虞，則應在接種疫苗後連續三天投與「泰微素」（Tylosin），以防嚴重接種反應發生。

在本省接種預防新城雞瘟，以採用左列方式比較安全可靠：

（1）產卵雞接種

- 第一次接種——孵化後第四天接種B₁株活毒疫苗。之後連續三天投與「泰微素」。
- 第二次接種——孵化後第二十八天接種死毒疫苗，每隻一〇・五西西。
- 第三次接種——孵化後第九十天接種死毒疫苗，每隻一〇・五西西。
- 以後每經一百二十天接種一次死毒疫苗，每隻一〇・五西西。
- （2）肉用雞接種
 - 第一次接種——孵化後第四天接種B₁株活毒疫苗。之後連續三天投與「泰微素」。
 - 第二次接種——孵化後第二十八天接種B₁株活毒疫苗。
 - 需要繼續飼養一百天以上的種雞或肉雞，在第一百天再接種一次活毒疫苗或死毒疫苗，每隻一〇・五西西。

接種疫苗對於新城雞瘟雖頗具預防效力，但是

家畜保險第十八次有獎徵答揭曉

（農會），洪枝財（高雄縣永安鄉農會），

臺灣省家畜保險輔導委員會舉辦家畜保險第十八次有獎徵答，應徵投保農民非常踴躍。全答對者計有二百一十八名，經省農會於五十八年三月十八日假臺灣土地銀行高雄分行三樓會議廳召開五十八年度第一次省縣市農會家畜保險工作會報公推農復會顧問楊守紳先生與合作金庫總庫副理周義通先生為監獎人，並由會議主席省農會總幹事劉金鈞主持公開抽籤決定獎次，其結果如下：

一等獎：顏通，臺南縣新營鎮農會，獨得價值三百元之電鍋一個。

二等獎：曾清裕，高雄縣田寮鄉農會，張雄（雲林縣斗六鎮鄉農會），

外獎：林建成（高雄市中梓區農會），張清江（高雄縣永安鄉農會），張文祥（高雄縣燕巢鄉農會），陳耀宗（高雄縣燕巢鄉農會），林連欽（彰化市彰化市農會），陳來興（高雄縣燕巢鄉農會），王慶雲（高雄縣田寮鄉農會），林木立（高雄縣湖寮鄉農會），蘇士員（高雄縣路竹鄉農會），楊成（花蓮縣池上鄉農會），沈戊守（高雄縣燕巢鄉農會），張雄（雲林縣斗六鎮鄉農會），

謝富榮（新竹縣新埔鎮農會），黃木生（苗栗縣苗栗鎮農會），王季敦花（高雄縣梓官鄉農會），各得價值二十元之汗衫一領。

各得獎者應得之獎品，於該工作會報席上，由省家畜保險輔導委員會總幹事呂純仁當場頒發各該所屬縣市農會家畜保險部主任轉發。

上期題底：一、應於發現後十二小時內；二、十個月；三、不可；四、不要；五、不可以。

要請記住：接種的雞隻，不一定個個都能產生高度的免疫抗體，所以，接種後的雞羣，仍舊注意衛生管理，嚴防新城雞瘟病毒的傳染。

充實消毒設備

注意例行消毒

產卵雞淘汰後，或肉雞出欄後，不管曾否發生疾病，雞舍、飼槽、水槽和雞籠等設備，都應施行充分的洗滌和有效的消毒。

雞舍的牆壁和地面，最好使用蒸氣消毒機充分消毒。飼槽、水槽和雞籠等器具，則應投入消毒池內浸漬消毒數小時以上，始可曬乾收存備用。

消毒藥液必須嚴格按照規定濃度泡製，始能達到消毒的目的。

添加各種藥物

增進抗病能力

在飼料中添加礦物質和維他命，可使雞隻保持正常的生活，增加抗病力。添加抗生素則能抑制腸內有害細菌的生長，增進有益細菌（乳酸菌和大腸菌）的作用，讓雞隻順利完成健康的發育，增加抗病力。

各種抗生素中，「金黴素」和「土黴素」不易產生耐性菌，有效範圍也比較廣泛，平常在每公噸飼料中添加結晶純量十分公。『福來頓』（Furazolidone）具有抗菌、抗原蟲和促進發育等作用，每公噸飼料的添加量為一百公。Amprolun 對於球蟲病具有特殊的預防效力，每公噸飼料的添加量為一百二十五公。Pyrimethamine 對於白冠病具有特殊的預防效力，每公噸飼料的添加量為〇・五——〇・公。Amprolun 和 Pyrimethamine 最好限於雞羣遭受球蟲病或白冠病威脅時使用，而且應注意用量，並需與飼料混合均勻。