

包皮色，又當時認為西西利島（Sicily Is.）上之野豬，以此塊莖為主食，其後經過調查，始知此塊莖含有苦味，却能成為動物之食品，着實令人難以想像，故此等傳說，只當是可信而不可信罷了。意大利文則進一步說為「土中之麵包」或「土中之蕪菁」等，不一而足；現在德國人仍稱為「阿爾卑斯（Alps）之三色堇」，於阿拉伯則稱為「山王之公雞」，諸如此類，有種種不可思議之別名。本花譯名仍從其音譯，尚頗雅順，且象徵着「客氣」、「內向」等。

盆花管理

- (1) 避免強風之吹襲。
 - (2) 一定要在每天早晨曬一——五小時太陽，以利其顏色鮮艷，但夏季不可直晒，宜妥為遮蔭，冬季則直晒無妨。
 - (3) 澆水次數及水量，視氣溫、日照而行。
 - (4) 澆水時可以淋及葉片，同時並洗去葉上灰塵等雜質，但不可直接淋及花朵。
 - (5) 已經開花之植株，盡可能置於冷涼處。
 - (6) 凋萎之花朵及葉片應儘早摘除，以免成為病原菌繁殖之溫床。
- 本文由種苗場謝博士克昌校正，仙克萊之能够首次在海灣試種成功，亦在謝先生悉心指導下進行

，又臺灣大學杜教授廣雅亦曾蒞場予以提掖，謹此一併誌謝。



玫瑰花

· 張 著 ·

玫瑰修剪

- (1) 不開花之枯枝、細弱枝、舊枝、罹病枝均須剪除。
- (2) 既使粗大枝，因日照通風不良，而向內側生長之枝或空心枝（不結實者）亦須剪除，只留強壯枝條。
- (3) 兩枝同時長出之新芽成平行之樹枝，只留一枝強壯枝，剪去另一枝。
- (4) 選優良之芽，從其上半公分處與芽平行之方向斜下剪除，切口須完整。
- (5) 開過之花枝，由完整葉（五個葉）芽的上面（約與花枝直徑同長處），與芽平行之方向斜下剪除，使其能從芽長出新枝。

玫瑰施肥

玫瑰花需要很多的肥料，但須少量多次施肥。種植前之基肥固然重要，生長中之追肥更為重要。一般在定植後半個月即可施肥，以後每半個月定期施肥一次。玫瑰花之主要肥分為三要素氮、磷、鉀，其成分比為一：二：一。

(一) 液肥

(1) 油粕加十倍的水，使之完全腐熟成為原腐汁，使用時再稀薄十——二十倍水，加入少許過磷酸石灰及硫酸鉀混合液，即可使用。

(2) 人糞尿（或豚糞尿），用法與前項相同。

(二) 乾燥肥料

(1) 玫瑰花專用營養素：玫瑰中心特製之營養素，純係有機質肥料，以豆餅、骨粉、魚粉等為主，含有豐富之三要素以及微量元素與植物生長荷爾蒙。

(2) 有機質：油粕（豆餅或菜籽餅）二份，骨粉一份混合充分發酵。每次一把，加草木灰一把，施放於離根部二十至三十公分之周圍，如沒有油粕，可用雞糞。

(3) 化學肥料：（無機質肥料）尿素一份，過磷酸石灰八份，硫酸鉀一份之重量比混合使用。

肥料之使用，以有機質肥料為主，無機質肥料為次，或輪流使用其效果更好。

防病蟲害

黑點病：可用大生二十二、好速殺、福爾丹。白粉病：大生二十二、可利生、大生精。蟲害：噴施馬拉松，地特松。



最完善輔助飼料，保證：

助生長

防疾病

多生產

賺大錢



新農畜牧有限公司

台北市中山北路一段53巷1號

電話：544330