



免先熟果腐敗。

(二) 經嫁接之好品種，定植後若管理良好者，四五年可結果收穫。

(四) 枇杷一般在冬末春初頂芽抽梢開花，果實則在三、四月間成熟採收，依品種略有差異。(李信芳)

龍眼優良品種

福眼糖酸肉眼

(問)：(一) 在北部二百公尺以下山坡地上栽培龍眼、荔枝那一種較適合？

(二) 龍眼優良品種有那些？

武村八十一號何庚申
荔枝兩種果樹，其適應之溫度範圍甚相似，夏季氣溫宜高而潮濕，山坡地高度不超過五百公尺均可種植，土壤方面，只要不是砂石太多，均為適宜。

(三) 龍眼優良品種有以下數種：

(1) 福眼：果實最大，味甚甜，品質最佳，重量八一一〇公分。

(2) 水肉眼：果實中等大小，味甚甜，重量六公分。

(3) 糖酸肉眼：果實中等大小，多肉味最甜，重量八公分。

(4) 銀子眼：果實小，品質頗佳，不適於製龍眼乾，重量四公分。

(三) 種苗採購，可向彰化縣永靖鄉五福村高厝新萬種苗園洽購。(葉鴻蘭)

樹果

枇杷經疏果後

即套耐水紙袋

成熟期，就發現大部份甚至全部果實有裂縫現象，是何原因？

(一) 枇杷果實將至成熟期，所用套袋材料有刺質張及透明塑膠袋，結果所採果實色澤不够佳良，只有小部份尚稱完整，應用何種套袋？

(二) 枇杷種幾年方可生果？

(四) 枇杷自開花至何時方有成熟果實？

臺北縣八里鄉米倉村渡船頭五號張野發

(答)：(一) 枇杷為復總狀花序，花由下而上次第開放，先開花先結果，任其自然成熟，往往早生果已成熟，而未開花尚未開放，當然無法收到優良果實，故基本工作應先行「疏花」(除去晚花生部分)。製果原因很多：品種、氣候、土質及管等均有影響。

(二) 疏花後果實如小指大時，再行疏果，除去過多小果，普遍留三、八果，依品種而定，即應套袋，套袋為必須工作，材料應用耐水紙袋(不宜用塑膠袋)，同時注意雨天

袋內積水，可在袋下角剪一小孔，近成熟期始套袋則太遲，難免日燒、病蟲及鳥類為害，因同穗果實成熟期不一致，故套袋後應依經驗隨時檢視，分一、二次分別採取，可

青

(問)：

肥較佳？

(問)：

(一) 龍眼應在何時施肥及施何種肥料？

(二) 同一時期與同一品種又以同樣管理方法栽培龍眼於山坡地，可是有些發育良好

有些樹葉略帶淡黃色，生長不良其故安在？(高

雄市郵局第三三七附號信箱葉


龍眼施肥標準

約與荔枝相同

瓜果肥料

種瓜要瓜大
種果要果美
台肥瓜果肥料
能使瓜果大又美

$N-P-K$
10-8-8



蔬菜肥料

水肥有病菌
更有寄生虫
台肥蔬菜肥料
無菌無虫功效宏

$N-P-K$
14-5-5



花卉肥料

鷄糞髒兮兮
水肥臭難受
台肥花卉肥料
清潔衛生頂不錯


$N-P-K$
5-10-8



柑桔肥料

不須再攪拌
不會被流失
台肥柑桔肥料
促進豐收實滿枝

$N-P-K$
16-8-12



台灣肥料股份有限公司第二廠出品
廠址：基隆東明路55號 各地經銷商均有出售