

農友經驗



如何保存蛋的新鮮

蛋類品質的好壞，和鮮度關係甚為密切。

保持鮮蛋最理想的方法，首推有冷藏設備的，其次是存於溫度低、濕度高的地下室以及防空洞，甚或存於古井深涼處都可以保持蛋的新鮮度。

倘若你有數量不多的蛋，而又一時無法找到上述理想地方時，各位不妨試試下列的方法——

往往用食鹽醃上，因食物加上鹽後，鹽粒會逐漸溶解為液體，它的滲透壓力甚強，能滲入細菌體內，吸取細菌的水分，使其無法生存。

我們就根據這個原則，將蛋埋在食鹽裏，稍俟半日左右，蛋殼上面的小孔漸（蛋孔）被鹽粉末阻塞，若蛋殼部份蛋孔沒有食鹽粉末時，務須用鹽將它敷密。

如此不但可防止細菌自蛋孔進入，而且具有殺菌作用。

從鹽裏出來仍放於陰涼處。我試過此種保存法，要比未敷鹽的，至少可耐十天以上。
（臺中縣豐原鎮鎮村里鎮村路二一十八號陳進昌）

公羊的閹割法

高雄縣湖內鄉 蔡存道
中興村六九號

仔羊除留著作種外如不去勢，其性狂亂放蕩，時起騷擾或踐踏飼料，因此不易肥育，且同一舍的小公羊互相鬪爭，幾無寧日，影響管理。茲將我閹割羊的經驗分述如後：

（一）閹割前的準備：（1）選擇晴天無風的時候，於光線明亮的地方進行。（2）在生後二週內進行為佳。（3）先將動物固定，令助手抱羊以其脊靠自己的胸部，兩手將羊四肢固定。

（二）使用的用具：閹割刀、剪刀、筆絲。

（三）閹割方法：（1）先用剪刀將陰囊部的毛剪光。（2）用消毒水消毒陰囊部及連肉。（3）用閹割刀切開陰囊部交第二層（肉樣膜）（4）用綑絲結紮精囊部。（5）用刀在結紮處的下部切掉，塗以碘酒。（6）再塗以Iodoform於傷口內部，傷口外部塗以複方平瀉油。（7）羊如大者再用一塊消毒布包住陰囊。

（四）閹割後處理：仔羊閹割後會感覺疲勞，應任其休息，並飼以容易消化的飼料，三—五日後即可復原。

水稻出穗後的各種病害防治法

這幾年來，水稻出穗後，即發生下列的病害：

- 乾莖倒伏
- 窒息病
- 穗首稻熱病
- 穗紋枯病
- 未熟脫落

農友們遇到這個病害時，心情急迫，而亂噴農藥，但是都無法治癒。

現在外國已經研究成功下列的防治理論：

1. 出穗後先噴灑水銀劑、多穗等持久性殺菌劑，以防病菌寄生。
2. 噴灑活性錳及鐵等各種微量元素，加強葉綠素的作用迅速恢復衰弱現象。
3. 同時噴灑尿素，促進蛋白質的結合作用，而強化組織。

要應用上記的理論，於出穗後，即時噴灑下列的配方即可：

1. 水：15公斤
 2. 水銀劑，多穗等持久性殺菌劑。
 3. 開根素：8公克
 4. 尿素：75公克
 5. 非肥皂粉：10公克
- 每隔5天噴灑一次，3次即可。
（45瓦裝批價15元）

天力化學工業股份有限公司
臺北縣中和鄉中山路41之14號
電話：968016 郵政劃撥5179號

殺菌劑 + 開根素 + 尿素 + 非肥皂。

（偏僻地區請到郵局利用郵政劃撥儲蓄金擔保員歡迎）
5179號匯款採購送貨郵費本公司無任
安全迅速方便無論一包二包無任