

農友經驗



如何保存蛋的新鮮

蛋類品質的好壞，和鮮度關係甚為密切。

保持鮮蛋最理想的方法，首推有冷藏設備的，其次是存於溫度低、濕度高的地下室以及防空洞，甚或存於古井深處都可以保持蛋的新鮮度。倘若你有數量不多的蛋，而又一時無法找到上述理想地方時，各位不訪試試下列的方法——

往往用食鹽醃上，因食物加上鹽後，鹽粒會逐漸溶解為液體，它的滲透壓力甚強，能滲入細菌體內，吸取細菌的水分，使其無法生存。

我們就根據這個原則，將蛋埋在食鹽裏，稍俟半日左右，蛋殼上面的小孔漸（蛋孔）被鹽粉末阻塞，若蛋殼部份蛋孔沒有食鹽粉末時，務須用鹽將它敷密。

如此不但可防止細菌自蛋孔進入，而且還有殺菌作用。

從鹽裏出來仍放於陰涼處。我試過此種保存法，要比未敷鹽的，至少可耐存十天以上。
（臺中縣豐原鎮鎮科里鎮村路二一十八號陳進昌）

公羊的閹割法

高雄縣湖內鄉
中興村六九號
蔡存道

仔羊除留著作種外如不去勢，其性狂亂放蕩，時起騷擾或踐踏飼料，因此不易肥育，且同一舍的小公羊互相鬭爭，幾無寧日，影響管理。茲將我閹割羊的經驗分述如後：

（一）閹割前的準備：（1）選擇晴天無風的時候，於光線明亮的地方進行。（在生後二週內進行為佳）（2）先將動物固定，令助手抱羊以其脊靠自己的胸部，兩手將羊四肢固定。

（三）使用的用具：閹割刀、剪刀、筆絲。

（四）閹割方法：（1）先用剪刀將陰囊部的毛剪光。（2）用消毒水消毒陰囊部及週圍。（3）用閹割刀切開陰囊部交第二層（肉樣膜）（4）用綑絲結紮精囊部。（5）用刀在結紮處的下部切掉，塗以碘酒。（6）再塗以Iodoform於創口內部，創口外部塗以複方平瀝油。（7）羊如大者再用一塊消毒布包住陰囊。

（四）閹割後處理：

仔羊閹割後會感覺疲勞，應任其休息，並飼以容易消化的飼料，三—五日後即可復原。

水稻出穗後的各種病害防治法：

寶作根素

這幾年來，水稻出穗後，即發生下列的病害：

乾莖倒伏
窒息病
穗首稻熱病
穗紋枯病
未熟脫落

農友們遇到這個病害時，心情急迫，而亂噴農藥，但是都無法治癒。

現在外國已經研究成功下列的防治理論：

1. 出穗後先噴灑水銀劑、多穗等持久性殺菌劑，以防病菌寄生。
2. 噴灑活性錳及鐵等各種微量元素，加強葉綠素的作用迅速恢復衰弱現象。
3. 同時噴灑尿素，促進蛋白質的結成作用，而強化組織。

要應用上記的理論，於出穗後，即時噴灑下列的配方即可：

1. 水：15公斤
 2. 水銀劑，多穗等持久性殺菌劑。
 3. 開根素：8公克
 4. 尿素：75公克
 5. 非肥皂粉：10公克
- 每隔5天噴灑一次，3次即可。
（45瓦裝批價15元）

天力化學工業股份有限公司
臺北縣中和鄉中山路41之14號
電話：968016 郵政劃撥5179號

殺菌劑 + 開根素 + 尿素 + 非肥皂。

（偏僻地區請到郵局利用郵政劃撥儲金5179號匯款採購送貨郵費本公司負擔安全迅速方便無論一包二包無任歡迎）