

### 果樹


#### 印度東嫁接 穗接易成活

【問】：大棗的嫁接方法如何，何時嫁接，枝條大小如何？（臺南縣善化鎮東昌里一〇三號陳順之）

【答】：印度東穗接很容易，不必用靠接。穗接時期以新曆一、二月最適宜。靠接可在任何時期舉行，但在雨季期間發易引起蟲害及腐爛等情形。靠接枝條大小以能配合砧木大小為適宜，因大枝條癒合後的傷口較大，宜避免使用。一般靠接用的枝條以選用鉛筆粗細的較為理想。靠接的刻傷部份可長達二寸。太短容易裂開。（張振宙）

#### 兩性株交配育苗 即可獲雌性木瓜

【問】：（）我家土椏果每年開花結果都比一般為晚，且在收成前大量落果，請問使用何種農藥混合何種殺蟲劑，能使它提早收成？（）木瓜有雌雄瓜，而我所理想的是母瓜（即四季瓜），請問在選擇種子時應用何種方法，使都成母瓜？（高雄縣燕巢鄉橫山村橫山



#### 路二號陳衛民

【答】：（）芒果收成前大量落果，除受特殊傷害外即為病蟲害所致，故應在抽穗期及果實發育期，每週噴佈大富丹四百倍稀釋液或大生四百倍液防炭疽病及噴速滅松一千倍稀釋液防蟲，連續噴四一五次，自有提高收成之效。

（）木瓜採取兩性株交配種子育苗，可得雌瓜而由種子木身，仍無法分瓣雌雄。（王兆全）

#### 多施磷肥少修剪 可提高柑桔糖分

【問】：（）如何管理才能提高溫州柑果實糖度？

（）如何提早果實成熟期？

（）柑桔形成硬心果的原因及防止方法如何？

（）請介紹數種適用於柑園之除草劑？

（）欲同時防治蚜蟲、潛葉蛾及潰瘍病等之發生，如何配合農藥一次施用。（許多推廣小冊，殺蟲劑無法與殺菌劑同時使用）

（）溫州柑栽培數年後，其砧木屢長出積殼枝條，而溫州柑生長緩慢，易萎黃該怎麼辦？（頭份鎮頭份里六二號之一新新食品公司林青村）

【答】：（）欲提高溫州蜜柑之糖度方法如下：（1）在乾燥地栽培。（2）多施磷肥。（3）減低修剪程度。使植株衰弱，即可提高柑果實之糖度。

（）提前果實之採收時期方法：除選擇早生品種並採用矮性砧木外，其他方法略同前項。即植株樹使衰弱時，可提早溫州蜜柑成熟期。

（）柑桔果心硬之原因為乾燥過度及硼素缺乏等。果實肥大期之灌水及硼素肥料之施用對防止果心硬化有功效。

（）柑桔園之除草劑，美國、日本等國家會發表很多種類，但對本省之氣候，雜草種類之適應性，殺草效果及對本省栽培柑桔之藥害等問題均未經詳細試驗。市販之除草劑不拘何種，請暫不採用，以免發生藥害或浪費金錢。

純國營農藥工廠 · 忠誠服務農民 · 保證品質優良

### 特色產品

#### 利我農乳劑

（惟一可供稻種消毒復作田間防治經正式推廣之稻熱病特效藥）

#### 47%巴拉松乳劑

（本公司獨特配方水稻螟蟲冠星）

#### 美稻乳劑

（各種水稻害蟲特效藥）

#### 米蘇靈乳劑

（各種水稻害蟲特效藥）

#### 速克丹乳劑

（洋菇蔬菜害蟲特效藥）

#### 大滅速乳劑

（柑桔害蟲特效藥）

#### 福利農乳劑

（低毒性之水稻香蕉及水產動物害蟲特效藥）

#### 新米蘇生液劑

（水稻紋枯病特效藥）

#### 魚藤精乳劑

（獨家產品低毒性蔬菜害蟲特效藥）

#### 其他優良產品甚多不及一一備載

（請向各地經銷商洽購）

#### 中農化工廠股份有限公司

公司地址：臺北市南陽街二十一號

工廠地址：臺北市景美中正路一三七號

附：徵求：「苗栗」、「新竹」、「桃園」、「宜蘭」四地區經銷商有意者請逕函本公司業務部接洽。

#### 各地經銷機構

新蓬萊農產行 設行段二四九號

亞北市迪化街一號

進臺中市向上路一之二五號

復興行 設行段一〇八—八八號

彰化員林鎮員鹿路

進豐行 設行段

豐林斗南鎮西歧里延平路81號

芳村農藥行

嘉義市中山路三十號

蓬萊農業資材行

臺南市公欄路四〇九號

興農行

屏東市復興路二九〇號

立成農藥行

花蓮市中山路一四二之廿八號