

鎮靜祛痰草藥——貝母

楊永裕·徐原田

貝母屬百合科，多年生草本，原產我國。鱗莖白且厚者為佳，呈球狀。莖直立，高四十公分，全草呈綠色。葉長約九公分，線狀，莖上三至四枚輪生。花六枚，鐘形花，下垂，呈黃綠色，二至三分。蒴果短六角狀，種子扁平。鱗莖供藥用，為鎮靜藥或供治療急性氣管支炎、肺炎、肺結核、祛痰等之用。

栽培方法

(1) 氣候·土質：溫暖而氣候條件好，富含水份的壤質壤土或砂質壤土為宜。多濕地土壤易腐敗。

(2) 繁殖法：專以球根（鱗莖）繁殖。種球在四至五月收穫。作成幅九十至一百二十公分，長短適宜的短棚形苗床，施用充分腐熟

堆肥和厩肥的混合物，覆上。條間十二至十五公分，株間三分，穴植。埋鱗莖，覆土三倍厚。植期為七月下旬至八月中旬。發芽後除草，並行中耕。翌年四月地上部枯死時，掘取種球。

七月下旬至八月中、下旬定植於本圃。肥料以堆肥為主。油粕或水肥之類亦可用之。每分地用量腐熟堆肥五百五十至七百五十公斤，菜種油粕七十五至一百公斤，草木灰二十公斤，水肥三百公斤（稀釋二至三倍）。肥料勿直接施於鱗莖。

定植畦幅四十五至六十公分，株間六至九公分，覆土（約種球直徑之三倍），並敷草。種球用量每分地約二

百六十公斤。
(3) 管理：種植後生根，翌春發芽。發芽後視雜草發生情形酌行中耕除草。勿使抽穗開花，宜次第摘除。本圃追肥用量應稍為增加。如有腐敗病發生，應以石灰乳劑消毒土壤。

調製貯藏

五至七月為收穫期。此時地上部已枯乾，掘取時注意勿損傷鱗莖。小形者供種球用，大形供藥用。

將泥砂打落，外皮除去，充分水洗，撒少量石灰，放置一晝夜，取出在晴天日晒三至七日。如氣候不順，應實施火力乾燥。石灰用量

多時，乾燥較快，但品質低劣，應注意。三百七十五公斤的鱗莖，以撒佈石灰末十五至二十公斤為適宜。每分地收量生根七百五十公斤。乾燥製品二百二十五至二百六十公斤。貯藏時應特別注意勿使受潮。



貝母

寶作根素開

這幾年來，水稻出穗後，即發生下列的病害：

乾莖倒伏
窒息病
穗首稻熱病
穗紋枯病
未熟脫落

農友們遇到這個病害時，心情急迫，而亂噴農藥，但是都無法治癒。

現在外國已經研究成功下列的防治理論：

1. 出穗後先噴灑水銀劑、多穗等持久性殺菌劑，以防病菌寄生。

2. 噴灑活性錳及鐵等各種微量要素，加強葉綠素的作用迅速恢復衰弱現象。

3. 同時噴灑尿素，促進蛋白質的結成作用，而強化組織。

要應用上記的理論，於出穗後；即時噴灑下列的配方即可：

1. 水：15公斤
 2. 水銀劑，多穗等持久性殺菌劑。
 3. 開根素：8公克
 4. 尿素：75公克
 5. 非肥皂粉：10公克
- 每隔5天噴灑一次，3次即可。
（45瓦裝批價15元）

天力化學工業股份有限公司
臺北縣中和鄉中山路41之14號
電話：966016 郵政劃撥5179號

水稻出穗後的各種病害防治法：

殺菌劑 + 開根素 + 尿素 + 非肥皂

偏僻地區請到郵局利用郵政劃撥儲金5179號匯款採購送貨郵費本公司負擔安全迅速方便無論一包二包無任歡迎