


長枝竹

·李遠慶·



形情長生竹枝長生平五

長枝竹是臺灣固有的竹種，全省各地均有分佈，多植於平地及山麓地帶，在海拔三百公尺以下的淺山地區最為常見，海拔七百公尺以上地區，則罕有栽植。

用途廣泛

根據臺灣省林業試驗所對臺灣產主要數種竹材之物理性質及化學性質，施行試驗結果，認為長枝竹竹材的長度、寬度收縮率均小，含水量低，抗彎強度大。由此可知，長枝竹竹材富有彈性而強韌，可供各種手工藝、建築、土木、支柱、編製籬、筐、籠、籃類、農具、床、傢俱以及各種玩具、裝飾品、竹細、農作物、支柱等用，其中尤以用為香蕉支柱最普遍。又據臺灣省林業試驗所，以臺灣產數種竹材做造紙比較試驗結果，認為長枝竹製成之紙漿強度最佳。故長枝竹竹材之用途無論在建築、工藝方面，或在製漿造紙方面，均有無限的前途。

繁殖容易

長枝竹在全省各地海拔七百公尺以下均可栽培，對土壤適應性頗強，在任何土壤均可生長，惟如果土壤深厚的肥沃地栽培可生長更佳。又因其抗風力，抗旱力強，也適於季風大或乾燥之地區生長。故非但為優良經濟竹種，也為一種理想的防風竹。

繁殖方法可分母竹移植法、插桿法、埋桿法三種。栽植時期原則上應在清明節前後，即三月至四月為最佳時期，但是本省南部，這個時期係干旱時期，因此南部可稍延至雨季進行，惟不宜過遲。

母竹移植法：也稱為分株法，母竹掘起移植，是一種廣用的方法。其竹苗可選取沒有病害的一年竹，將距離地面一公尺處的竹桿切斷，而後以斧頭、鋤或利鋤掘起。掘起時應在栽植前一日行之。如係遠地運搬，應用草袋包裹，內須加敷潮濕的苔蘚或麻袋絨，以防乾燥。運搬愈快愈好，途中尤忌日曬及風吹，並須不時淋水，如能利用夜間運搬更佳。竹苗運到目的地後應置於陰濕處，並時時淋水。其栽植方法為將母竹一株栽植於預先掘好的植穴，植穴大小為深五十公分，一公尺見方，先將表土填入穴內約二十公分，如施堆肥，宜與土混合，栽植深度以原來母竹入土深度，再加深五、十公分為準，不宜過淺，也不宜太深。母竹栽植時，略成傾斜狀，約七十五度左右，覆土應分數次，每次覆土應踏緊，直至母竹不動搖為止。栽植完後，再在母竹桿上端切口灌水，如以稻草或棕皮包裹更好。本方法成活率高，成林也快，惟母竹價格昂貴，運搬不便，且費用較高，如欲大量採掘母竹更屬不易。

插桿法：選出發芽後約一至二年的竹桿，採伐後運至栽植地點，置於陰濕處，用利刀或鋸將竹桿每二節截為一段，節上的枝，保留長十公分，扦插時也略成傾斜狀，插穗之切口露出土面，植穴大小普通徑一公尺，深五十公分，插植後用腳踏緊並在插穗切口露出土面部份灌水。每一支竹桿可取七至十穗，插穗應採自基部三分之二以下部份，竹尾部份不宜採用為插穗。本方法也可以將自竹桿採取

點要病雞治防

基永李



一般性雞病之預防蔓延必須靠個人及大家共同努力才能把雞病縮小，減少損失。即：

個人方面：(1)

按期接種疫苗。(2) 雞場內外環境保持清潔衛生及消毒。(3) 不准外人參觀。

(4) 進入雞舍時手腳必須消毒及換過雞舍內專用衣服及鞋。(5) 流行地區最好不用不明來路之青菜。

(6) 不可從外面購雞作食用。(7) 飼料應該買紙袋成品不可用麻袋飼料。

(8) 雞舍老鼠、蠅蚊及其他可能作媒介之動物要徹底消滅。

(9) 早期發現病雞及撲殺燒却。

(10) 要雞羣少感染少發病少損失的話，平常必須注重慢性病(如白血病、球蟲病、雞白痢及蛔蟲條蟲等)之消滅及可利查，CRD併發症之預防才能有效之控制。

大眾方面：(1) 發生本病時迅速通知政府機關，請協助防疫。

(2) 病雞要燒，却不可亂擲在水溝或任何地方。

(3) 絕不可把病雞運至市場，想撈回一筆本錢。

(4) 有本病發生雞場不可售出小雞。

(5) 購買飼料時不可亂摸飼料槽之飼料，以免傳染病之污染。

(6) 販賣飼料的人，絕不可替人家看雞病或解剖病雞。

以上雖然係一種未十足全之意見，但若人能注意以上各點行事的話，我想可把這個談虎色變般之可怕雞病，明顯地縮小其蔓延程度。