


水稻田空中施藥（鮑國琛）




一般飛行次序

以每分地散佈三公斤藥劑來計算

- 藥效和藥害等問題，決定施藥與否。
- (5) 散佈方向應與風向垂直。
 - (6) 散佈次序應自下風開始逐漸移至上風。
 - (7) 飛行速度以每小時四八公里為基準。
 - (8) 飛行高度以三至四公尺為基準，但應依氣象條件和作物生育狀況而略加修正。
 - (9) 有效散佈寬度依上述飛行高度和速度時應為一八公尺，所以飛行間隔應保持一八公尺。
 - (10) 散佈開始和終了的地點以及散佈地區周圍等，容易發生散佈不均或不足等現象，所以應補正散佈。
 - (11) 地形複雜和障礙物多的地區，應在氣象條件較好的時候散佈。
 - (12) 應特別注意藥害和危害的防止措施。

時，直昇機一次的載重量約為一五〇公斤，所以每飛一次就可散佈五公頃（五甲），所以每一散佈地區（一百至二百公頃）應再適當分成幾個五公頃的小區域。

圖六表示小區內的風向和飛行次序的關係。



圖六：小區內風向和飛行次序的關係

新進口武田農藥

稻熱病撒佈用有機水銀劑

武田マル錠

台北市建設局農藥登記證0104號

新型低毒性有機磷劑

材ペスタン®

柑桔：粉介殼蟲、紅蜘蛛
水稻：飛蟲、負泥蟲
香蕉：粉介殼蟲

台灣省農林廳農藥登記證345號

土壤害蟲特效藥

武田ヘプタ粉劑

台灣省農林廳農藥登記證093號

立農牌農藥

品質優良

敬請愛用

水稻紋枯病

滅

紋液劑

蔬菜吊絲蟲、青蟲

益

利

農乳劑

柑桔害蟲、西瓜蚜蟲

強

力

樂

乳劑46

樂

果

果

乳劑20

(大)

滅

(速)

水稻二化螟蟲、三化螟蟲等

強

力

滅

拉松乳劑

富

穗

多

乳劑

特製 B H C 粉劑3%

水稻飛蟲、黑尾浮塵子特效農藥

好

寶

益

乳劑

(所有農藥皆有登記證)



武田藥品工業株式會社

立農化學工業股份有限公司

台北市南京西路22號•電話：541246•541108