

農友經驗



割去雜草好處多

田裏插秧後，爲使它們迅速成長繁殖，我們都供給了足夠的肥料和水份，看到稻苗欣欣向榮，內心真有無比的興奮。

第二次中耕除草時，發覺田邊雜草過於茂盛，岸邊的草根都爬進了稻行裏去，它們不但盜去了施下的肥料，同時又是各種病蟲害的寄居所。於是，我利用了幾次時間，把岸邊雜草全部割下，用畚箕挑回家，浸入豬尿水裏，當它腐爛後，還是堆肥的好材料呢！（彰化縣埔心鄉油車村三十八號巫仁和）

* * *

三年養雞經驗談

民國五十五年春天，我參加古坑鄉農會推廣股舉辦的南部養雞觀摩會，途中發現一位農友飼養一對本省常見的野雞，羽毛十分美麗，回家後決定試養雞雛，經三年來的繁殖，目前已有數百隻。

本省的氣候頗適合雞生長，其體毛有五彩艷色，頸部有兩鬚的角毛爲黑色，頸部有純白色的圓環，尾部有一・五一二釐尺長，節節有花紋，非常優美。雞雞肉質甚嫩，味道芬芳可口，既可供觀賞又可供食用。

茲將我飼養的經驗簡述於下，以供給愛好飼養雞雛的各位做參考：

(一) 品種

現在本省的雞雛約有三品種：(1) 本省的野生種，(2) 英國改良種，(3) 美國改良種，後者體形大體毛優美，是較優良的品種。

(二) 飼養管理

(1) 雞雛：孵化出來的小雞要即時放入育雞箱內飼養，其溫度爲華氏九十一至九十五度爲佳，經三十天後成爲中雞，始得放入雞舍內飼養。育雞箱需要簡便，省本却實用，常用的尺寸爲高寬各一・五英尺，長三英尺，內積的一半爲保溫室，一半爲日常的自然溫度，保溫室內點有一個四十P.W.電燈，外面用木板密蓋確保溫度，任其雞雛選住適溫的地方，小雞的飼料以蛋白質二十四%以上的高熱能飼料爲佳（每公斤約六元），並放置一、二個的給水器以便飲水。

(2) 中雞：經育雞箱飼養三十天後放入雞舍飼養，日漸成爲中雞，體毛逐漸換新，雄雌亦漸分明，此時飼料亦可降下爲蛋白質二十%（每公斤約五元）的中雞飼料。雞舍的設備多數由自然地形而定，常見的尺寸高六・八英尺，寬三英尺，長六英尺，即半坪爲一室，外面設有露天的運動場，以便遊蕩，及日光浴、洒露之用。爲恐飛逃應蓋鐵網，以防萬一。

(3) 成雞：開始飼養約一百二十天—一百五十天就成爲成雞，體毛全部換新十分優美，飼養管理與中雞相同，雄雌兩方開始發情時，始得配種，一雄四雌爲宜。

(4) 預防疾病
雞雛的抵抗力弱，需預防注射，



友農興振黃

雞和家雞不同

三十天後施行第一次，經三十天後再施行第二次，以後每三個月一次，施行雞瘟及家禽コレラ預防注射，如此不斷繼續預防。平常飲水中投入少量的消炎劑，如金微磺胺素或コリンソ等以預防疾病。

(5) 產卵：雞雛原是野生，故

* * *

(一) 養雞與養雞不盡相同，因爲是家禽，雞是野禽，雞經人工馴養歷史尚短，其生活習性及抗病力，仍多少保有牠天然的野生適應性，故養雞者首須注意空氣流通，陽光充足，並保持環境的清潔與安靜，以順應其自然習性。

(二) 雞雛優良鑑別方法：(1) 時間判別法：雞雛產蛋期通常爲每年清明或穀雨之前後，有時因受氣候之影響而提前產蛋者，其受精率必低，而所產的蛋亦小，所孵出之雛，其體質弱，抗病力亦差，似不宜選作種雞之用。(2) 外形觀察法：正常雞雛，其身體雄壯，行動健捷，神情活潑，善於鳴叫而喜飛躍，其絨毛有光澤，富彈力而潔淨者即爲優良的雞雛。如神情頹喪，絨毛蓬鬆而污穢者，非病即劣。

(三) 育雞注意要點：除應注意保持適當的溫度（第一週三十八度，第二週三十五度，第三週三十二度餘此類推），防止疾病及啄毛等，並應按照各類不同品種，分別予以不同的設備（雞舍）及管理。如美英種，因性情溫馴，可按一般育雞法管理，如本國或日本種，因野性未馴，應用特設置的雞箱，並儘量使其安靜，以避免驚擾（因驚恐而亂飛亂撞致創傷者應立即分別塗藥並放保護箱急救）。

(四) 中雞的管理：中雞最好能按公母分別飼養，因雄者成長較快，所需養份亦高，而雌者成長較慢，且不宜餵飼過肥（因過肥其產蛋率必低），待至產蛋期前再與雌雄相配改換飼料，以增強產蛋及受精率。如雄者過多時，可以去勢法育肥。

產卵有季節性，通常在清明季節前後開始產卵，平常爲六十一八十個，一百個以上者即爲多產雞，孵化與一般雞相同，或用電氣孵化亦可。

(五) 成本

雞雛三十天每隻每日飼料〇・〇二公斤，單價約六元
中成雞共一二〇天每隻每日飼料爲〇・〇六公斤，單價約五元
設備每隻約十元
合計約五十五元就可飼養一隻的成雞（自己育出來的雞雛）

雞雛的價格不一定不能計算。（雲林縣古坑鄉水碓村五十一號黃振興）

* * *

南投中興新村劉博智
光華四路六一之六號