

護保物植

白木耳耳蟲猖獗

DDVP可防治

【問】：(一)本人所種白木耳於一個月內開始滴水，至今雖約有七或發耳，但所發木耳大部份均枯萎或枯黃，致成功者僅二成左右，經檢驗所澆之水，發現含有鹽分○.一二%以上，及含有昆蟲穿棲於木耳上，隨菌附上樣品(昆蟲棲息於白木耳)請示其原因及應如何防治？(臺南縣下營鄉仁里村一三六號陳賜)

【答】：所送來之白木耳標本，係害蟲為害，其害蟲以跳蟲為多，請用左列方法防治。

(一)準備廣場並打掃清潔地面，附近用DDVP二千倍消毒。

(二)將有蟲之段木集中於此廣場內，將DDVP之原液放於廣口瓶或小碗中(每立方厘米十CC左右)平均分佈於段木堆各部份，上用P.P.塑膠布蓋閉，利用DDVP之氣體殺滅約兩天。

(三)將段木場用DDVP，二千倍液消毒，並割除附近雜草，事竣後搬回段木場架立，照常管理即可收防蟲效果。(杜白蠟)

阿特靈消毒土壤

預防地下切根蟲


【問】：(一)辣椒常被一種灰黑色，軟體，似蠶的害蟲，在接近地面稍上處將莖咬斷，然後鑽入土中將嘴伸出地面嚼食莖葉，不知此蟲何名，應如何防治？

【答】：(一)辣椒樹幹上出現白色絮狀，又像紫膏一堆一堆的團狀物，不知此為何名，應如何防治？(新店鎮十四張路四十號之二顧樂之)

柑園殺草劑

試用克蕪踪

【問】：貴刊十八卷二三期殺草劑特輯中給予深刻印象，我是一個果農，柑桔園面積頗廣，不知何種除草劑可以利用，其性質及價格如何，何處有售，對果園雜草是否有效？(羅東鎮信義里與東路二四七號張正榮)



種或移植前一星期至十天，採用四十多阿特靈可濕性粉劑加水一百倍均勻撒布地面，再拌入土中，使藏匿於土中之切根蟲因在土壤中與含有藥劑之土壤接觸而毒死，這樣將來播種或移植之幼苗就不再被切斷為害，每分地所用阿特靈可濕性粉劑為六百至九百公克。

如沒有採用阿特靈消毒土壤時，幼苗期可採用三十五多安殺菌乳劑五百倍或二十五多DDT乳劑三百倍噴射幼苗植株及地面植株附近之土壤，但噴藥工作應在下午實行效力較好。

【答】：(一)檸檬樹幹上發生白色絮狀物，可能是真菌寄生如白紋羽病、真菌病等，也可能是吹綿介殼蟲或球粉介殼蟲等介殼類寄生為害，如前者可先割除菌體後，再用二十至三十倍的石灰硫黃合劑或為斯普龍二百倍在患部上塗刷，如係後者介殼蟲為害，可用五十多滅速乳劑一千倍或二十五多福木松乳劑五百倍噴射防治。(張良傳)

柑桔患根腐病

施美濃可防治

【問】：我栽植將近一百餘棵的柳橙，種植到現在已將近三年，每棵生果四十餘個，但最近葉片上變黃，死去了七棵，我想是毒線蟲，但是經用「豐年牌」「泥塵」等均不見效，請問這是黃龍病嗎？(南投縣中寮鄉義和村永平路五二三號廖振昌)


【答】：病葉呈微量元素缺乏之病徵。此病徵，由於黃龍病及根腐病也會引起，為第二病徵。查看根部無腐爛時即為黃龍病，若為黃龍病只好拔除。假如根腐病時，請即將腐爛根剪除，施「施美濃」一千五百倍於根部，剪定上枝。(蘇鴻基)

柑園殺草劑

試用克蕪踪

【問】：貴刊十八卷二三期殺草劑特輯中給予深刻印象，我是一個果農，柑桔園面積頗廣，不知何種除草劑可以利用，其性質及價格如何，何處有售，對果園雜草是否有效？(羅東鎮信義里與東路二四七號張正榮)

西德「實的」背負式動力噴霧機 STIHL SG17



一架優良的背負式動力噴霧機，必須具備下列條件：
馬力強大，體積輕巧，操作方便，堅固耐用等特點。
而「實的」動力噴霧，噴粉機完全擁有上列特點。
不信，請看它的性能：

出力：5馬力
重量：8.17公斤
噴霧量：3.08公升 / 分
噴距：10.72公尺

備有全部現貨正廠零件詳細說明書函索即寄。

台灣總代理：義誠貿易有限公司

台北市開封街1段83號 電話：334543·364446



STIHL Motorsägen 705 Waiblingen