



適合小家庭消費 新木瓜型小南瓜

——賴森雄——

市面上的南瓜，多數是大果型，主要供作蔬菜或飼料用，品質較差。在小家庭盛行的今日，為適應家庭消費，農林廳種苗場於民國五十三年開始進行南瓜育種工作。五十五年十月，選出果重約一·五—二·五公斤的新果型，與木瓜相近，所以叫做新木瓜型南瓜。新品種植株生育旺盛，葉淡綠色，由播種至果實成熟約七十—九十天。對日照感應遲鈍，每蔓隔五—七節開雌花。果皮為淡黃色稍帶綠紋，果肉金黃色，厚而緻密。子室小，耐貯藏，每十公畝產量約二千至四千公斤。

週年可以播種

南瓜對於溫度的適應性很廣，在平均氣溫攝氏十五—三十度下均可生長發育，但氣溫若超過攝氏三十五度以上，則易發生畸形瓜。若氣溫過低，亦易受霜害，一般日夜溫差大的環境下，形成的果實、品質較佳，因其炭水化合物的消耗較少，澱粉的蓄積較多，糖份較高。南瓜為淺根性作物，對於土質的選擇不嚴格，只要排水良好，日照充足土壤均可栽培，在中性砂壤土最適宜栽培。

南瓜在臺灣平地可週年播種栽培，新木瓜型南瓜最適宜的播種期如下：中部—九—十二月，北部—十二—二月，海拔五百—八百公尺的準高冷地則為二—三月，九—十月。海拔八百公尺以上的高冷地為四—六月。

栽培管理方便

南瓜種子發芽適溫為攝氏二十五—三十度，若在攝氏十度以下或四十度以上則不發芽。故播種時若氣溫過低，可先催芽再播種，催芽時將種子先用八百倍有機水銀劑（如谷樂生、烏斯普龍）浸三十分鐘，再將種子浸在攝氏二十五—三十度的水中二十四小時，然後用濕布包起來，放在較溫暖處，約二—三天即可發芽。每十公畝之播種量約六十一—八十公克。

播種：一般南瓜多採直播方式，亦有先育苗再定植者，育苗時可用土六份

水稻：二化螟蟲、三化螟蟲

死心蟲、捲葉蟲

特效藥。

沙利好M 40% 50%

意大利 Sariaf 出品

U.C.B.M 50%

比利時 聯合藥廠出品

水稻：浮塵子、褐飛蟲

特效藥

①因克靈 50%

②因克靈 80%

水稻：紋枯病特效藥

滅枯速液劑
紋克速粉劑

柑桔蔬菜：赤銹病、露菌病

特效藥

維多A (大生78)

維多M (大生22)

因克命80 (大生22)

所有農藥均有登記証

成分正確·藥效保證

特力松	(可溶性) 粉劑	80%
滅蟲靈	乳劑	25%
豐谷	乳劑	50%
和豐松	乳劑	46.6%
安谷樂	乳劑	50%
治蟲樂	乳劑	40%
泰山松	乳劑	48%
利百殺	乳劑	50%
萊旺生	乳劑	25%
必有效	乳劑	50%

BHC	粉劑	3%
殺蟲丹	乳劑	10%
蟲必淨	乳劑	50%
(馬拉松)		
和賜靈	乳劑	25.3%
適滅松	乳劑	50%

和力松	乳劑	20%
馬拉松	水和劑	25%
滴着死	水和劑	50%
保谷王	水和劑	85%
BHC	粉劑	1%
適敏	粉劑	1.5%



和豐農化廠股份有限公司

彰化縣和美鎮彰新路5號

TEL: 彰化 3518號