

堆肥三份，砂一份為培養土，以十二—十五公分×十七公分的聚乙烯袋分裝，每袋播二粒種子，播種深度為三—五公分，育苗期夏天約十二—十五天，春秋十五—二十天，本葉二—三片時即可定植。苗床在低溫期可用白色的聚乙烯布覆蓋，以昇高苗床的溫度，雨季可用砂布覆蓋以防雨水沖刷。

南瓜的生育旺盛，一般種植的株行距為畦寬二公尺，株距一·五公尺，每十公畝種三百五十株。

施肥：南瓜的需肥量較胡瓜少三—四成，十公畝的施用量一般為氮素十七—二十公斤，磷酸十三—十五公斤，氧化鉀十七—二十公斤。

南瓜若氮肥施用過多，易引起徒長，落花落果，同時南瓜亦易發生缺鎂的現象，故每十公畝最好施用七十五公斤的苦土石灰。

一般肥料施用時，氮肥三分之一作基肥，餘三分之二作追肥。磷肥全作基肥，鉀肥三分之二作基肥，三分之一作追肥。一般追肥分三次施用，施於蔓的前方，第一次約於定植後十天，第二次於定植後二十五天，第三次於果實直徑四—五公分大時施下，以後依植株狀況再行施用。

每十公畝（一分地）施肥量（單位：公斤）

肥料種類	總量	基肥	第一次追肥	第二次追肥	第三次追肥
堆肥	八五〇	八五〇			
苦土石灰	七五	七五			
硫銨	八〇	二六	一八	一八	一八
過磷酸鈣	九三	九三			
氯化鉀	三四	二二	四	四	四

摘心：當木葉五—六片時摘心，使其發生側枝四—五枝，任其伸長看果。

病蟲防治：病害以白粉病、細菌性斑點病、軟腐病（危害幼果）、疫病、露菌病、炭疽病、菌核病等發生較多，尤其在多雨通氣不良時最易發生。一般病害的防治為每隔十一—十五天定期噴施「大生二十二」或「新萬生」即可。

蟲害以黃守瓜、果蠅及蚜蟲發生較多，可用「萬靈」防治，殺菌劑可與殺蟲劑同時施用。


耐於貯藏運輸

新木瓜型南瓜於開花後約三十五—四十天果實才充分成熟。此時果梗變為木栓化，且發生三—四條裂縫，果皮面生白粉，果皮與地面接觸部份變黃即可採收。

貯藏：南瓜一般可貯存四—五個月，貯放場以冷涼乾燥、通風良好處較適宜，以免溫度高呼吸作用旺盛，消耗果實貯存之澱粉，致肉質風味變劣。

宿谷牌シクタニ


DM-50 3.3 馬力



背負動力多兼機


噴霧頭

葉下兩側
稻飛蝨剋星



高壓動力噴霧、灌水兩用機

HS-5



（誠徵各地經銷商）



空中旋轉撒雨器

1. 超輕量8公斤
 2. 用單相 $\frac{1}{2}$ 馬力馬達
- ▲本公司備有東海印ビニルホース每丸100m及日製各種特殊噴頭。
 - ▲本公司可負責包辦菜園之噴霧及灌水配管工程。

（備有各型另件供應服務）

代理商 三易行有限公司
臺南市公園路179號 電話：25810