

注意仔豬鎖肛
趕快施行手術

• 欣聯張 •

家畜生出來缺少肛門而不能排糞的情形叫爲鎖肛，是一種先天性畸形，但發生實例不少，尤其仔豬的發生特別多，其他家畜則較少。若不仔細觀察多不易察覺，普通患病仔豬出生四—五日後腹部漸漸膨脹起來，動作很不自然，有的雖有排便動作而排不出來，但有的豬則完全缺少排糞動作，因此常不易發覺。

此種豬隻可能發生鎖肛，雌豬鎖肛有的雖無肛門但可由陰門排糞，因此鎖肛同時又併發直腸膨脹，此種鎖肛雖對豬隻的生長沒有阻礙，任其由肛門排糞仍然可以和普通的豬隻一樣發育生長。但另一類鎖肛不一定會有直腸膨脹，屬於真正的鎖肛而無法排使。

的一層膜被蓋，而不能排糞。直腸閉塞症。另一種爲完全缺少肛門，但肛門被皺疊的，缺少肛門，曾遇有二種情形，一種是單純的鎖肛，即雖有肛門，但肛門被皺疊的，以造肛手術，否則豬隻因排不出大便不吃東西，或嘔吐糞便終至胃腸破裂，或血毒死亡。單純的鎖肛手術較易，癒後良好，但肛門部至直腸盲端的距離愈長，手術越困難，愈後亦不良。

造肝手術的時期越早越好，在腹部膨脹等臨床症狀發現前進行最好，等到腹部膨脹，症狀惡化時手術可能愈後不良。通常於出生後數日內進行爲適當。如能在仔豬分娩後，剪臍帶同時觀察肝門，早期發現鎖肝豬，做記號而經三四日後手術爲最好。

手術方法

(一) 器具：
消耗品：準備外科刀（尖刃）、剪刀、鉗子、把針器、縫合針及絲線、紗布、五西西（CC）注射器、消毒藥水、生理鹽水、局所麻醉藥及碘酒、酒精綿、紅汞水等一般外科手術器具藥品。

(二)保定：
令一個助手將仔豬倒立於股內保定，或縛其四肢橫臥於手術台上。

(三) 麻醉：以一至二西西(C.C.) 一—二%鹽酸普羅卡因液，注射於尾根部下面，直徑二—三公分的皮下做爲局所麻醉。


(四)手術：(1)肛門部的消毒：先用肥皂水洗淨皮膚，再以碘酒塗抹消毒。

(2) 僅以薄膜閉塞的肛門，可以外科刀將膨隆肛門部中心以十字形切開一至一·五公分，或以探子穿通後用擴張棒，鈍性擴張即可。此種手術很少出血，痊癒很快效果良好。

新年度！八卦牌新陣容！

裕台農藥

品質保証



裕台企業股份有限公司農業化工廠

廠 址：彰化市中華西路一二六號 電 話：三〇四四

總公司：台北市衡陽路六十四號