


提早鳳梨花芽分化

——春季黃——



有效果。貽風或豪雨後處理之效果差，故應選連續數個晴天而當晚無雲較涼爽時處理之。在處理完畢後，約隔三、五天，再照樣處理一次可以提高其處理之效果。

蔡乙酸（NAA）處理之方法為以NAA〇・一毫克片劑投入植株基部，如乾燥無露水時，每株基部應灌注清水二十—三十公分，以便藥片易於溶解。本法在秋季（八—十月）處理時，效果不甚穩定，故不宜使用，但如在春季處理時則效果頗佳。

鳳梨可利用碳化鈣（又名電石、電土）或蔡乙酸（NAA）處理，引誘花芽分化提早結果。電石處理之方法可分為電石水及電石粉（粒）兩種，電石水處理之用量為〇・五—一・〇%之電石水每株灌注五十公撮，而電石粉（粒）處理之用量則為每株投入電石粒〇・五—一・七公克。電石處理時應注意鳳梨植株要發育良好，並須有完全葉二十五片以上時始可進行處理。秋季進行電石處理時心須要在夜間，尤其是在午夜至黎明這一段時間內進行最

（3）如果切開皮膚而無法打通者，則是缺損直腸末端的真正鎖肛。此種情形可以鉗子鈍性分離組織，通達直腸盲端，找到盲端後以固定線穿通直腸，慢慢牽引，同時鈍性剝離直腸周圍組織，至腸盲端沒有感覺緊張為止，即很容易牽出肛門皮膚緣。以紗布製成直腸周圍剝離面，剪開直腸盲端，宿糞自然排出於體外。如果腹圍膨脹程度不嚴重者，用手壓擠排除腸內大便，灌入生理鹽水洗淨腸內面，盡量使腸內糞便排出。

腸粘膜切離緣與皮膚切開創口，以結紮縫合法（每一縫合處打一個結）縫合。本法愈後依盲腸之距離而定愈短者愈好。

（4）有時盲腸距離太長，操作困難而找不到直腸盲端者，應放棄上述手術，而改在下腹部施予造肛手術，其部位為恥骨前而（雌豬在正中線、雄豬在正中線之側面），消毒麻醉，切皮與前項相同，並將腹肌、腹膜切開尋找直腸盲端，牽出創口外，按前法排除宿糞及縫合。但本法術式較困難，愈後不一定良好，效果不能期待。

（5）新豬之造肛手術，隨猪隻生長而肛門相對漸小，按實際排糞情形而有必要擴大，若肛門太小排糞困難，應將肛門周圍皮膚切開二至三公厘深三四處（對稱的），肛門即可擴大。

（五）其他：同於一般療法，創傷藥因碘酒刺激較大，使用紅藥水較好，為了防止化膿或併發腹膜炎，可併用油質配尼西林，手術後應略減食，使其早日痊癒。

鎖肛仔猪手術後雖癒亦不得留為種猪，應肥育出售。

鳳梨可利利用碳化鈣（又名電石、電土）或蔡乙酸（NAA）處理，引誘花芽分化提早結果。電石處理之方法可分為電石水及電石粉（粒）兩種，電石水處理之用量為〇・五—一・〇%之電石水每株灌注五十公撮，而電石粉（粒）處理之用量則為每株投入電石粒〇・五—一・七公克。電石處理時應注意鳳梨植株要發育良好，並須有完全葉二十五片以上時始可進行處理。秋季進行電石處理時心須要在夜間，尤其是在午夜至黎明這一段時間內進行最

新進口武田農藥

稻熱病撒佈用有機水銀劑

武田マル錠

台北市建設局農藥登記證0104號

新型低毒性有機磷劑

林ペスタン®

柑桔：粉介殼蟲、紅蜘蛛
水稻：飛蟲、負泥蟲
香蕉：粉介殼蟲

台灣省農林廳農藥登記證345號

土壤害蟲特效藥

武田ヘプタ粉劑

台灣省農林廳農藥登記證093號

立農牌農藥

品質優良

敬請愛用

水稻紋枯病

滅

紋液劑

蔬菜苗雜蟲、青蟲

益

利

農乳劑

柑桔青蟲、西瓜蚜蟲

強

力

果乳劑46

樂

果

乳劑20

(大)

滅

(速)

水稻二化螟蟲、三化螟蟲等

強

力

滅拉松乳劑

富

穗

多乳劑

特製

B

H

粉劑3%

C

粉劑3%

水稻飛蟲、黑尾浮塵子特效農藥

好

寶

蟲乳劑

〔所有農藥皆有登記證〕



武田藥品工業株式會社

立農化學工業股份有限公司

台北市南京西路22號・電話：541246・541108