

柿子

德有康

台灣嘉義以北山坡地，海拔在三百公尺到八百公尺的地方，都可以生產柿子。

柿樹的生長較為緩慢，生育較快的品種第四年即可開始結果，但開始經濟生產的年齡要到第十年以後。柿樹的壽命長，四、五十年以上的老樹，仍能結果正常的。

由於柿樹在近十年來，沒有提倡栽培與推廣，生產的面積逐年下降，例如在光復初，柿的種植面積約為四百餘公頃，但到了民國五十五年，全省僅有二百六十餘公頃了。

沒有提倡栽培與推廣的原因為，果實不耐運輸及貯藏，在採收之後到食用之前需要脫澀的處理，而處理後的果實更加不耐貯藏與放置了。此外，果實中的糖粉高，酸分少，較之高級水果，如蘋果、梨、柑桔等，既少香氣又乏果汁，在鮮果市場中，不能擠在第一流的水果種類中，因之身價較低，生產者也就沒有很大的興趣了。

但是，柿果可以加工成柿餅；葉片色澤濃綠，外形美觀，可以作庭院中的觀賞樹木；木材質地堅硬，是高級傢俱的材料，皮及幼果可以提取單寧。

柿子對於土壤的適應性廣，病蟲害較少，因此實有再為提倡種植的必要。在某些山區及村舍的附近都可以加以栽培的。

至於柿苗木，由於沒有推廣，繁殖的也就很少了。台灣大學園藝場保存有二十個品種。有枯木用的，有本地品種，有大陸的華北品種，也有日本的甜柿品種，結果都很正常。

枯木的品種有台東豆柿，本地的品種有牛心柿、四周柿、華北的大磨盤柿、日本的正月、次郎以及百目等品種。


本省軟果用品種有紅柿，脆果用品種有牛心柿等。

註：嘉義縣水上鄉南鄉村七號傳

乙倫來信詢問有關

柿子栽培問題，本

刊特請台大園藝系康有德教授解答如上，請參考。



紅柿(軟果用品種)

(種用品果脆)柿心牛

(柿甜)柿月正

水稻：二化螟蟲、三化螟蟲

死心蟲、捲葉蟲

特效藥

沙利好 M 40%
50%

意大利 Sariaf 出品

U.C.b.M 50%

比利時 Ucb 聯合藥廠出品

水稻：浮塵子、褐飛蝨

特效藥

(特) 因克靈 50%

(特) 因克靈 80%

(M) 滴着死 50%

水稻：紋枯病特效藥

滅 枯 速 液 劑
紋 克 速 粉 劑
新 紋 聖 水 劑

柑桔蔬菜：赤銹病、露菌病

特效藥

維多 A (鋅乃浦)

維多 M (錳乃浦)

因克命 80 (錳乃浦)

所有農藥均有登記証

成分正確 · 藥效保證

特力松 (可溶性) 粉劑	80%
滅蟲靈 乳劑	25%
豐谷 乳劑	50%
和豐松 乳劑	46.6%
安谷樂 乳劑	50%
治蟲樂 乳劑	40%
泰山松 乳劑	48%
利百殺 乳劑	50%
業旺生 乳劑	25%
必有效 乳劑	50%

BHC 粉劑	3%
殺蟲丹 乳劑	10%
蟲必淨 (馬拉松) 乳劑	50%
和賜靈 乳劑	25.3%
適滅松 乳劑	50%

和力松 乳劑	20%
馬拉松 水和劑	25%
保谷王 水和劑	85%
BHC 粉劑	1%
適敏 粉劑	1.5%



和豐農化廠股份有限公司

彰化縣和美鎮彰新路5號 電話：彰化3518號