

# 綠色的圍牆

吳家齊

利用綠色花、草、樹木或竹類等修剪成的綠籬和垣牆，是造園藝術中常用來美化環境的一種手法。

公共庭園設置矮綠籬，減低界限感覺，遊客可自由觀賞花木，如建築磚石垣牆，不但經費大，且阻礙視界，心胸也無法清爽開朗。

城市公園，每設於市區中心或繁華地區，遊客複雜，攤販林立，綠籬可以保護花木，兼供觀賞。

機關、學校、私人庭園設置綠籬與垣牆，內外界限明顯，人在園內永遠有着清新舒暢的

感覺，增進工作效率。

用作綠籬的樹種，隨個人的愛好與趣味不同，一般常見的有：台灣連翹、木槿、老來嬌、木麻黃、月桔、榕樹、羅漢松、竹、三角楓、扁柏等。凡枝葉繁茂，發芽力強，一年四季常綠及植株下部枝葉不易枯萎者，適於修剪的樹木，均可採用。

將矮小茂盛的灌木，修剪成一堵綠色的小圍牆，用來代替磚牆即是綠籬。選擇綠籬，如果是以點綴景物為目的，可用吐放柔白花的月橘（七里香），它除了花與葉悅目外，且一年四季開花，又是蜜蜂的好蜜源。如果是私人住宅庭園，為了防止竊盜，則可用節節生刺的九重葛（三角花）。

如為了堵塞園外的風沙，則可用紅花綠葉爭妍的扶桑，再於扶桑花間，每隔二公尺，種植一株檳榔，這樣，在密密麻麻的扶桑花裏，又有一層稀鬆的檳榔，雖然重複，但復而不亂，給人有一「籬又一籬」的感覺。

垣籬的材料和形式，完全依庭園的面積大小、形狀、經濟條件等而有精簡不同，一般常用的有鐵柵、木柵、竹柵以及磚牆。

(一)鐵柵：用於高大建築物的周圍，或在住宅的正面，以區劃房子與庭園。鐵柵高度自一公尺至二公尺不等，視環境需要而定。鐵柵選用之鐵條，高度矮小者，應選用細鐵條（直徑一公分），較高的鐵柵，可酌予加粗（直徑約二公分）。

鐵柵一般漆以古銅色、深灰色、或黑色。為免風雨腐蝕，可先塗防腐漆為底漆。

(二)木柵：用於正式庭園，所用材料以檜木板為主，形式整齊劃一，木柵設置地點，大都在園路兩旁，及花壇周圍，因此，木柵高度自五十分至二公尺不等。木柵的顏色，以白色或米黃色為理想，顏色過深不適當。木板下端，若需埋入地中，則應以火燒或塗上柏油，以防腐朽。自然式庭園，面積較廣潤者

## 牌子老日產★農藥成份確實

水稻、蔬菜、果樹害蟲之驅除  
殺蟲範圍廣，可收綜合防治功用  
請用：**毒性輕微、藥力速效的**

註冊商標

### 益農產乳劑

エ ル サン 50%

藥力強 / 殘効性期長 /  
最適合水稻、果樹害蟲之驅除

註冊商標

### 心愛用乳劑

P I N 45%

### 紋穗液劑

水稻紋枯病特效藥

### 大生精乳劑

園藝蔬菜病害殺菌劑

### 大滅蟲乳劑

蔬菜害蟲專用殺蟲劑

### 樂果乳劑

果樹紅蜘蛛特效藥

### 荷蒙綠混合肥料

ホ モ グ リ ン

經精製結晶之空素葉面散佈劑  
生長快 / 防止隔年結實 /

中日技術合作 台灣日產化工股份有限公司 電話：771348  
台北市內湖區安康路140號

，可用不去皮的小木棒代替，則有一種古雅自然的美。

竹柵：在建築物後院及菜園、果園等地方，可選用竹柵。

竹柵材料以桂竹、觀音竹為主。桂竹可劈成竹片應用，觀音竹因其幹莖細小應整枝使用。竹柵因需要不同，在建造時，竹與竹間空隙的大小，可自由調整。竹柵在庭園重要部份設置時，需講求美觀、形狀與色彩的變化。竹柵的顏色除保留原色外，可加以塗烤，或用化學藥品着色，以配合建築物的色彩。

磚牆：若能與庭園、建築物的形式配合最為理想。如自然式庭園，其材料可以山石、海石等不規則的形狀砌成，而規則式庭園，則可配合磚牆按規律化排列，這樣更能表現襯托出顏色的美。磚牆的建造，宜有形式變化，否則和一般圍牆無異，就未免太刻板了。

垣籬的形式，除前述外，尚有半節垣籬，半節綠籬的配置，即上半段為鐵柵或木柵，下半段是磚牆。然後於牆內栽植一些珊瑚藤等緣性植物，使其纏繞於木柵、鐵柵的上面，採用此種佈置，兩者皆盡其用，不但實用而且美觀。綜上所述，垣籬有種種形式。作垣籬美化自己的家園、學校、機關、公司，不但分明了界限，更能因此提高建築物的身價。

### 選領要領 趙博秋

無線電尚未發明前，鴿子是幫助人們傳遞訊息的最快速工具，直到現在，鴿子在軍事和商業上還有許多用途。傳信鴿子的好壞取

決於飛翔耐力和體格強健的程度。另外眼睛的視力要好，選擇方法是看眼球的角膜是否澄清如水，瞳孔的收縮和放大是否很靈活，眼球的水晶體是否澄清。若瞳孔收放靈活，眼球水晶體發亮，就是一雙好眼睛。另外要看訓練是否成功。所謂訓練成功是使鴿子熱愛自己的家，認識自己的周圍環境，飼養鴿子要定餐與定時，隨飼養者的號令進食，並且須在自己家中吃，以養成鴿子愛家的習性。

### 雌雄鴿的辨別法

(1) 雄鴿的體軀較大，脖子粗短，鳴聲強，聲音粗會打「咕啞」。雌鴿的體軀較小，脖子較細鳴聲短而

尖，雖然也會打「咕啞」，但聲音細弱而柔和。


(2) 鴿的肛門部份下面，若用指輕輕撫摸時，可以摸到兩條耻骨，雄鴿的兩條耻骨距離比較狹窄，雌鴿的耻骨距離較寬。

(3) 雄鴿的肩幅較寬廣，脛趾較長，龍骨較長，而雌鴿的肩幅較窄，脛趾較短，龍骨也較短。

鴿子孵化後，雌鴿五個月後開始生蛋，鴿子的生蛋有季節性，通常在春、秋兩季較多。

鴿子一年下蛋在熱帶地方最多，可達十三次，但通常在春秋兩季約六至八次。

註：南投鎮武西里八卦路一號施敬土農友來信詢問有關鴿子選擇問題，請參考。



## 新進口武田農藥

稻熱病撒佈用有機水銀劑

# 武田メル錠

台北市建設局農藥登記證0104號

新型低毒性有機磷劑

# 材ペスタン®

柑桔：粉介殼蟲、紅蜘蛛  
水稻：飛蟲、負泥蟲  
香蕉：粉介殼蟲

台灣省農林廳農藥登記證345號

土壤害蟲特效藥

# 武田ヘブス粉劑

台灣省農林廳農藥登記證093號

## 立農牌農藥

品質優良

敬請愛用

水稻紋枯病

滅 紋液劑

蔬菜吊絲蟲、青蟲

益 利 農 乳劑

柑桔青蟲、西瓜蚜蟲

強力樂果 乳劑 46

樂果 乳劑 20

(大 滅 純)

水稻二化螟蟲、三化螟蟲等

強力滅拉松 乳劑

富 穗 多 乳劑

特製 B H C 粉劑 3%

水稻飛蟲、黑尾浮塵子特效農藥

好 寶 蟲 乳劑

(所有農藥皆有登記證)



武田藥品工業株式會社

立農化學工業股份有限公司

台北市南京西路22號·電話：541246·541108