



## 樹果

荔枝糯米糍

核小糖分高

【問】：「糯米糍」荔枝品質如何，苗木何處有售？（新營鎮忠政里中山路一六〇號張耀仁）

【答】：「糯米糍」荔枝果實具有肉厚，核小及糖分高等優點，由於在本省結實率低，產量不高，非為主要荔枝栽培品種，苗木亦非大規模出售，在本省改良場、試驗所及中南部農家有零星栽培，如需苗木可接洽繁殖。（范念慈）



雜交木瓜

不能留種

【問】：「鳳山熱帶園藝試驗分所」之全名地址要怎樣寫？

【答】：「蘇魯一號」木瓜種子，是否為雜交種子？

【問】：鳳山熱帶園藝試驗分所除蘇魯一號供應外，有無其他雜交木瓜種子供應？

【答】：雜交木瓜不能留種，何故？（香港新界大埔墟遠街四號A雷深）

【問】：（全址）「台灣省高雄縣鳳山鎮鳳山熱帶園藝試驗分所」，英文全名為：Pengshan Tropical Horticultural Experiment Station, Fengshan, Kaohsiung, Taiwan.

【問】：「蘇魯一號」為固定之純種，非雜交種子。

【答】：目前鳳山熱帶園藝試驗分所，僅有「蘇魯一號」木瓜種子供應。

【問】：雜交第一代種子，各性狀因多屬異質結合狀態，倘自交授種，則後代將起分離，有的回復至父本性狀，有的回復為母本性狀，有的保持雜種狀態，呈參差不齊（不純），故不能留種。（王德男）

酪梨富含脂肪蛋白質

【問】：酪梨的營養價值如何，要怎樣食用？（台東縣桐村改良十四號趙仰仁）

【答】：酪梨形似梨而非梨。肉質乳酪狀，故名酪梨，日本稱之為鱈梨。本省自民國七年引進，果實成熟時呈淡綠、赤紫或暗綠色，依品種而異。肉質一般為淡黃或乳酪色，富有脂肪及蛋白質，每百克中所含熱能超過雞類及牛肉，營養價值極高，但脂肪少，食之味似奶油而帶有胡桃香氣。果實採收後，需經後熟軟化方可食用，或在攝氏三十至四十度中經五至十天，使轉色柔軟，即可開生食，唯風味難適合國人之一般口味。西洋人常取出果肉後，再加鹽、糖、醋、醬油調味，與麵包同食，亦有將果肉細切，拌加胡瓜、番茄或其他水果等，製成沙拉或三文治食用，據說較一般蔬菜或肉類製成的沙拉或三文治，味道更好，不妨一試。（李信芳）

## 稻水

水稻倒伏原因多

合理施肥可改善

【問】：一、二期稻快成熟時，由於稻莖不夠硬，以致全部倒伏，不僅稻粒不能飽滿，並且影響甘諸發育，是否稻作缺鉀肥所致？或稻飛蟲所害？（嘉義縣山鄉瑞峰村外寮六號陳清州）

【答】：水稻倒伏的原因甚多，依照來信看，可能是氮肥施用過多而鉀肥的施用較少，致稻葉繁茂稻莖軟弱倒伏，請改

### 魚塢肥料

N-P-K  
4-14-2


養魚有祕訣  
收穫三倍多  
台肥魚塢肥料  
飼養鮮魚大又肥



### 蔬菜肥料

N-P-K  
14-5-5

水肥有病菌  
更有寄生蟲  
台肥蔬菜肥料  
無菌無蟲功效宏



### 花卉肥料

N-P-K  
5-10-8


雞糞髒兮兮  
水肥臭難受  
台肥花卉肥料  
清潔衛生頂不錯



### 柑桔肥料

N-P-K  
16-8-12

不須再攪拌  
不會被流失  
台肥柑桔肥料  
促進豐收實滿枝



台灣肥料股份有限公司基隆二廠出品  
廠址：基隆東明路55號 各地經銷商均有出售