


# 花卉



(文達部) 蘭蝶翅栽盆

## 火球花

(問) 田中火車站黃添福先生所植一花，黃色形似繡球，不生枝葉僅生花，據六月十三日中國時報報導為端午節花，請問該花正名是什麼？(大甲高級農業職業學校劉坤德)

(答) 根據所附剪報圖片，認係 *Haemathus* 原為希臘語 *haima* (血) 加上 *anthos* (花) 而得名，因此，此屬花多為紅色，中文譯名可稱為「火球花」英名稱為 *Blood-lily*，熱帶非洲產者有六十餘種，地中有鱗莖，卵圓形外被皮膜，園藝上屬石蒜科球根花卉，多數小花若生而成密繖形花序，故呈球形，花球直徑十一二十公分，花色以紅色較多，亦有白、橙、淡紅等色種，屬於紅色花有：① *H. Coccineus* L. ② *H. Katherinae* Baker ③ *H. Konig* ④ *H. horti* ⑤ *H. Lindenii* N.E. Br (本省有) ⑥ *H. Multiflorus* Martyn

(本省有)

屬於白色種有 *H. albilos* Jacq，屬於橙紅色種的有：① *H. Natalensis* Pappex ② *H. Punicus* L. 田中火車站長黃添福先生若有彩色照片，當可判斷種屬。劉農友若欲參看此方面資料可參考：

① 日本最新園藝大辭典卷二，第九三八頁。

② A.B. Graf: *Exotica* 3 p. 92-93

③ L.H. Bailey: *Manual of Cultivated Plants*, p. 255 (杜鰲姓)

## 蘭花

(問) (一) 原生蘭花適合栽植的有多少種，如何分類？

(一) 蘭花繁殖方法如何？(南市安南區公埤里一一四號顏久能)

(答) (一) 蘭花的原生種，有一萬五千餘種，加上人工雜交育成的品種，共有數萬種。

所有的蘭花分為兩大類：一類是氣生蘭如嘉德麗亞蘭(俗稱西洋蘭)蝴蝶蘭、萬帶蘭等都是，氣生蘭用蛇木屑、樹皮或水苔等物栽培。一類是地生蘭，適於用土壤(特製的培養土較佳)栽培，如中國蘭，一般常見有報歲蘭、素心蘭以及鶴頂蘭、金線連蘭等。

(二) 種蘭花，用苗或種籽都可以，初種時最好用苗栽培。(呂淑濤)

(問) (一) 蘭花葉上發生褐色凹陷病斑，漸及全株，病斑上有如微斑出現，是何病？

(一) 如何防治？

(二) 發病的原因是什麼？

## 立農牌農藥

品質優良

敬請愛用

水稻紋枯病

滅 液 劑

蔬菜吊絲蟲、青蟲

益 利 農 乳 劑

柑桔青蟲、西瓜蚜蟲

強力樂果 乳劑 46

樂果 乳劑 20

(大 滅 速)

水稻三化螟蟲、二化螟蟲等

強力滅拉松 乳劑

富 穗 多 乳 劑

特製 B H C 粉劑 3%

水稻飛蟲、黑尾浮塵子特效農藥

好 寶 益 乳 劑

[所有農藥皆有登記證]

## 新進口武田農藥

稻熱病撒佈用有機水銀劑

武田メル錠

台北市建設局農藥登記證0104號

新型低毒性有機磷劑

材ペスタン®

柑桔：粉介殼蟲、紅蜘蛛

水稻：飛蟲、負泥蟲

香蕉：粉介殼蟲

台灣省農林廳農藥登記證345號

土壤害蟲特效藥

武田ヘブス粉劑

台灣省農林廳農藥登記證093號



武田藥品工業株式會社

立農化學工業股份有限公司

台北市南京西路22號•電話：541246•541108

# 知識

④要施用何種肥料？(鳳山鎮道明中學施慶彰)

(答) ①所寄蘭花病株標本是微病為害。

②可用大生(各式均可)四百倍液噴撒全株，每五至七日噴撒一次，注意葉之兩面均應噴撒。為害嚴重部份應剪除燒掉。

③發病原因甚多主要是：(1) 蘭室通風不良。(2) 日照不足。(3) 蘭盆排水不良。(4) 蘭室環境清潔情況不良。若有上述情形應設法改良，當可避免。

④蘭花肥料，一般西洋蘭(如嘉德麗亞蘭等氣生蘭類屬之)可用美國特製蘭花肥料 Hyponex 稀釋二百一三百倍噴撒根部及蘭盆，或用尿素稀釋二千倍噴撒整個植株，每二一三月一次。東洋蘭類(包括所有地生蘭)可用腐熟後豆餅上澆液加水二百倍後施用於土面。(呂淑濤)

## 嘉德麗亞蘭

(嘉德麗亞蘭新芽，發育停止，漸漸萎爛而枯死，這是何病，用何種藥劑防治？)

(嘉德麗亞蘭的新芽，常有蟻類聚集上面，是否會影響蘭株的發育，如何防治？)

(廣東梅花用壓條法繁殖，何時期最適合。(台南縣白河鎮河東里一四二號張顯承)

(嘉德麗亞蘭，原產中南美洲，花大而艷麗，一般所謂洋蘭即

以此花為代表，嘉德麗亞蘭新芽發育停止，漸漸萎爛枯死是萎腐病，恒與根腐病互為因果，即根部先發生腐爛現象，然後影響新芽發育。

(1) 預防法：①盆內蛇木屑或其他填充物應保持新鮮，視實際情形每一至二年更換一次。②使盆內排水良好。③花盆放置於通風地方。④每月噴撒大生八百倍液一次。

(2) 治療法：①剪下燒掉罹病嚴重枝芽，並換盆及填充物。②每週噴撒大生八百倍液一次。③栽培室以二百倍福爾馬林液消毒。

④蟻蟻對於蘭花雖不能直接為害，但可招致蚜蟲，應以一千五百倍馬拉松稀釋液噴撒防治。

(廣東梅花壓條繁殖，以春季三四月最為適宜。(呂淑濤)

## 福蘭

(福蘭播種前應如何選種？)

(播種前的消毒除用「烏斯普龍」外，是否另有他法？)

(福蘭種子的消毒，是否因品種而異？(雲林縣大埤鄉尚義村柳樹脚七一號聯興碾米工廠江義宏)

(球根定植前所謂選種，有幾個目的：(1) 病蟲害之有無。(2) 早開或遲開。(3) 大小球分植等，其中以病蟲害問題最為重要。

(福蘭種球消毒除「烏斯普龍」外尚有昇永水，惟前者兼有催芽作用，後者殺菌力很強，稍有抑制發芽現象，尤其對未經冷藏球更顯著。此外「賜保根」粉劑，「大生」等殺菌劑均有效。

(任何品種均應消毒，所用方法相同。(杜廣姓)

柑桔蔬菜：赤銹病、露菌病  
特效藥

維多 A (鋅乃浦)  
維多 M (錳乃浦)  
因克命 80 (錳乃浦)

水稻：浮塵子、褐飛蟲  
特效藥

(特) 因克靈 50%  
(特) 因克靈 80%  
(M) 滴着死 50%

水稻：紋枯病特效藥  
滅紋新 枯克新 速速聖 液劑 粉劑 水和劑

水稻：二化螟蟲、三化螟蟲  
死心蟲、捲葉蟲  
特效藥

沙利好 M 40% 50%  
意大利 Sariaf 出品

U.C.B.M 50%  
比利時 ucb 聯合藥廠出品

\*所有農藥均有登記証\*

### 成分正確·藥效保證

特力松 (可溶性) 粉劑 80%	BHC 粉劑 3%	和力松 乳劑 20%
滅蟲靈 乳劑 25%	殺蟲丹 乳劑 10%	馬拉松 水和劑 25%
豐谷 乳劑 50%	蟲必淨 乳劑 50%	保谷王 水和劑 85%
和豐松 乳劑 46.6%	(馬拉松) 乳劑 25.3%	BHC 粉劑 1%
安谷樂 乳劑 50%	和賜靈 乳劑 50%	適敏 粉劑 1.5%
治蟲樂 乳劑 40%		
泰山松 乳劑 48%		
利百殺 乳劑 50%		
菜旺生 乳劑 25%		
必有效 乳劑 50%		

**和豐農化廠股份有限公司**  
彰化縣和美鎮彰新路5號 電話：彰化3518號