

·宏政張·

？蟲生寄外的狗除驅樣怎



狗是人類的好朋友，無論在城市或鄉村裏，許多人家都養狗，白天是兒童們的良伴，夜裏看門守戶防盜賊。狗可以說是家庭中的一員，經常和人生活在一起，狗的衛生，不容忽視。

狗的外寄生蟲有跳蚤、虱、壁虱及毛囊蟲等，但一般以跳蚤、壁虱及狗虱為最多，可以左列方法防治，請養狗農友參考：

用法嚴格執行驅蟲殺蟲，家畜醫院、狗店或犬訓練所有代售。

(一) 牛猪安 (Nervon 西德拜耳藥廠出品) 二百倍至三百倍水溶液七—十四西 (大型狗) 或五西西 (小型狗) 塗布於狗的頭、頸、背以及尾部正中線被毛根部，形成一條縱帶 (從頭到尾)。此藥液約可維持一星期有效。

(二) 阿森托 (Asuntol 西德拜爾廠出品) 二百倍至三百倍水溶液。用量及使用法與牛猪安相同。

(三) 牛猪安及阿森托混合液：即三百倍牛猪安水溶液一份，及二百倍阿森托水溶液一份，充分混合後塗布於狗被毛根部，用量及使用法與牛猪安同。但阿森托之效力比較長，有效期間大約可維持十個月左右。

(四) 複方煤油醇三%溶液，俗稱臭藥水或 Creal 肥皂液，用於消毒水溝、地板或廁所等。用三%藥液給狗洗澡，但藥液不必太多，能使狗毛濕即可。經十分—十五分鐘後用清水或溫水沖洗，把藥水洗掉後拭乾狗體。以上五種方法不論那一種，應用時需注意防止狗吃進及喝下的藥液或浸入眼內，以免中毒。

(五) 臭藥水：跳蚤咬血後每天約產十個蛋左右，這些蛋卵在狗身上、地板、狗籠及狗毯等各處經一—二星期後孵出仔蟲，經脫皮三次幾變為蛹，此期間需十天—三百六十天左右。再經七天之蛹期後變為成蟲。因此狗跳蚤之仔蟲幼蟲及蛹都在地板上發育，必需殺死這些未成熟之跳蚤才能撲滅。把三%臭藥水噴霧或撒布於地板牆壁、狗舍等，以便殺死這些跳蚤幼蟲。

用臭藥水時最好每二星期施行消毒一次。如果用第四項之牛猪安阿森托混合液消毒時，每二個月一次即可。但下雨藥液被雨水沖走時，需馬上再施行消毒狗舍、地板等，而不宜用 DDT 或 BHC 等殺蟲劑，以免中毒。

註：台南市建國路一四七號姚錫祥等位農友來信詢問狗蚤問題，請參考。

神效的藥
鐵般的事實



石原農藥

開放進口!!

原裝進口
普遍供應

(農藥字1048號)

抄錄54年度植物保護試驗簡報

54年於台南區改良場試驗

蕃茄多旺
トマトトーン

增加收成47% · 改良品質增進色澤
提早採收一星期 · 減少畸形怪果

項目	處理	一分地產量 kg	收量指數	畸形果
無處理區		2,469.10	100	12
トマトトーン 50倍液區		3,466.61	140.40	5
トマトトーン 100倍液區		3,639.45	147.40	3

(北市農藥字48號)

根多旺 ルートン

發根促進劑、促進蔬菜種子的發根
各種果樹、園藝作物之插苗、插木

(農藥字346號)



防止水稻倒伏
增加有效分蘗
更能增收20%

(說明書備索)

植物保護技術審議委員會推廣

台灣總代理 大豐農藥股份有限公司

台北市興陽路13號3樓
電話：334703 · 337858