



蔬

農林廳種苗場
推廣小型南瓜

【問】：(一)新木瓜型小南瓜，二期水稻收穫後，可種植否？
(二)如果採直播方式要多少日才發芽，直播需要催芽嗎？

【答】：(一)整地是否會麻煩？
(二)新木瓜型小南瓜種子，何處有售？
(三)土庫鎮大老里好收正五號蔡秋水、馮煥生

【答】：(一)新木瓜型南瓜對日照感應遲鈍，全年均可種植，為提高品質及風味，除雨季(結果期)外，均可種植。在實地二期水稻收穫後可以種植。

【答】：(一)如果採直播方式，需先浸種六~十二小時，催芽後播種，三~五天可整齊發芽。

【答】：(一)南瓜在瓜類中算最粗放，整地並不麻煩。

【答】：(一)新木瓜型小南瓜種子，台中縣新社鄉大南村農林廳種苗繁殖場業務課洽購。每包三十公克重，零售二十元，您可購三包九十九元，該場郵局劃撥儲金帳號是中字第二一八〇四號。(張自治)

韭黃栽培方法

【問】：(一)韭黃如何種植？
(二)種子何處有售？

【問】：(一)潮濕土地是否可種？
(二)用何種肥料？(木柵溝子口光明路光明弄四二號楊永達)

【答】：(一)經過軟化處理後的韭黃。目前在本省普遍用草席覆蓋軟化。在韭菜植株分蘖旺盛，生育良好，抽葉多達十葉以上時，先割去地面之葉，同時在行間每隔若干距離用長五~六十公分小竹竿交叉插入土中，交叉點在株行列上方，以繩紮牢，再以長竹竿橫架在交叉架上，上覆草袋，普通蓋兩層草袋，即成三角形隧道，此即韭菜軟化處理，高溫軟化十一~十二天，低溫軟化十七~十九天即可採收韭黃。

【答】：(一)台灣中部永靖一帶種植最多，種子可向永靖各種苗店購買。
(二)過於粘重低濕排水不良或粗糙乾燥之圃地，不宜種植。

【答】：(一)應注意堆肥或厩肥、尿素、過磷酸鈣、氯化鉀之配合施用。每十公畝應用堆肥或厩肥一千公斤，尿素七十公斤，過磷酸鈣一百三十公斤，氯化鉀六十公斤。(丁俊傑)

樹果

南部經濟果樹
大葉粗鱗釋迦

【問】：(一)釋迦目前有何品種？
(二)該品種，適宜何種地區與土壤？
(三)可否用插枝繁殖，樹齡若干年？
(四)有何病蟲害，如何防治？
(五)何時用肥，施肥量若干？

【答】：(一)目前品種有大葉粗鱗片及小葉細鱗兩個品種。
(二)仍以中南部地區栽植，採輕鬆砂質壤土為宜。
(三)扦插不易生根，可用嫁接法繁殖，樹齡可達三、四十年。
(四)常見的病蟲害有小蜂類、金龜子、粉介殼蟲、銹菌病及裂果病等，防治法請詳閱本刊十八卷第十九期「別具風味的釋迦果一文」。

【答】：(一)請介紹有關釋迦種植書籍？(台灣糖業公司虎尾總廠斗六糖廠四十八號王光舟)

【答】：(一)韭黃如何種植？
(二)種子何處有售？

強力——品質保證——速效



以色列

穗必旺 水利劑 50%
RAYON W. P. 50%



※說明書備索※
(各種農藥均有登記證)

◎防治：水稻浮塵子、飛蝨類等之特效藥

荷蘭

因哈審 萬利果錳粉



水利劑
INHASIM MANEB

◎防治：瓜類、蔬菜、果樹等病害之特效藥

甲殺松 乳劑
50%
METHYL PARATHION
50%



◎防治：二、三化螟蟲等特效藥

(保證原裝進口)

進口廠商：青松貿易有限公司

台北市承德路12巷9號 TEL. 557003