



惠光藥菜

品質優良·效果保證

殺蟲劑

大易富萬大必淨	必樂收靈綠樂	隆產靈殺死蟲	劑劑劑劑劑劑	乳乳乳乳乳乳
---------	--------	--------	--------	--------

殺菌劑

好新好滿保好	速豐生	殺生靈生靈	劑劑劑劑劑劑
--------	-----	-------	--------

殺蝸牛劑

蝸立死	劑	粒
-----	---	---

惠光農藥應有盡有·任意採購
各地經銷處：請參閱本刊19卷17期

各種說明書及產品目錄備索
(所有農藥均有登記證)

惠光貿易有限公司
公司：台南市東門路231號
惠光化學股份有限公司
工廠：台南市富強路511號

從育苗到定植

改良場去年辦理播種期試驗，分爲九月十一日、二十一日和十月一日及十一日四次播種，育苗時間四、十五至五十天。試驗結果指出，「長岡交配早生」的產量都比加州種高，而播種期延後時，產量就有減少的傾向。

爲了探討孢子甘藍水田冬季裏作的經濟價值，又使用「長岡交配早生」做試驗。結果產量雖然稍爲降低，但是可以在三月下旬或四月上旬同時全部採收，能够配合第一期水稻栽培。

苗圃的準備：苗圃用地先撒佈苦土石灰，每公畝地二十公斤，然後犁起整地，再施腐熟堆肥二百公斤和糞菜用複合肥料四公斤，充分混合後作成畦面寬一公尺的苗床。

播種：要育成十公畝地用苗，需用六十立方公分（約四十二公克）的種子，和八至十平方公尺的苗圃。播種後用竹片做成一公尺高的竹架，用塑膠布作屋頂式覆蓋（但不要密閉），以防止日光直射，並預防驟雨沖擊爲害，確保育苗成功。

將種子撒播後，稍爲鬆土輕壓，覆蓋稻草，並充分澆水。以後早、晚各澆水一次，至發芽即除去稻草，繼續管理。

假植：假植用苗圃必須設在排水良好的地方，以免泥土過濕，引起苗立枯病。播種後十天，準備假植苗圃，面積七十平方公尺。爲提高成活率，宜在陰天、雨後或無風時一次假植。二本葉時是假植的適期。以株間十二公分的密度假植最爲適當。假植後暫時遮日保護，每天早晚各澆水一次，但成活後每天澆水一次即可。

苗期病蟲害防治：苗圃期間會發生蚜蟲、青蟲、吃心蟲和苗立枯病等病蟲害。爲了防治青蟲，每星期噴射DDVP或EPN一千倍液一次。爲了防治苗立枯病，應先行床土的消毒。

定植：苗株本葉七葉（播種後約五十天）即可定植。爲防止鈣缺乏症的發生，在定植前十天，每

十公畝地撒布一百至二百五十公斤苦土石灰（或消石灰一百二十公斤），耕鬆整地。基肥用的過磷酸鈣八十公斤，在定植前施用，然後作畦。定植時要有充足勞力，迅速定植。

「長岡交配早生」種的株行距，畦面一·一公尺的一畦種二行，行距五十公分，株距五十公分爲標準。每十公畝地種植二千八百株。畦溝通常爲三十公分寬。春雨期間排水較差的地方，應作高畦以利排水。

定植前苗圃應充分澆水，小心挖苗搬運。挖好定植穴後澆水定植。發育不良或徒長苗儘量不用。

施肥：孢子甘藍生育期間長，爲求生產品質優良的菜球，需要多施肥料。每十公畝地標準施肥量是氮素三十公斤，磷鉀二十公斤，鉀質二十五公斤。但應視地力肥瘠酌予增減。

追肥每隔二十天施用一次。在菜球開始結球時，不宜多施氮肥，以免菜球鬆開。結球期間更忌施用氮肥。