



(日百本杜) 庭園花木

# 庭園花木

庭園花木的種類很多，每一家都喜歡種植一些花草樹木，我們經常收到讀者們的來信詢問這一類問題，現在整理發表在這裏。我們相信，同一個問題，對於別人也是有多參考價值的。

## 荷花

荷性喜肥沃而富含有機質壤土或粘土，栽植前宜深耕田土，並充分施用基肥，以腐熟厩肥或堆肥等有機肥料為理想。每公畝施用堆肥一百公斤，充分與田土混合。種植前宜選用強健無傷及無病蟲害種根。

荷花生育期間，喜溫暖氣候，方可生長強健，開花美麗，倘若管理不當，則荷葉枯黃變小，臨花期而不能開花。

荷花忌連作，若有病蟲害發生，可予廢耕，使土壤休閑半年，再行上述栽培，當可使花葉繁茂。(呂淑濤) 註：金門漁家恭農友來信詢問荷花，請參考。

## 樹蘭

樹蘭是常綠複葉小喬木，原產我國南部，花黃呈小粒狀，五瓣具芳香。

繁殖方法有普通條與空中壓條二種。於春季三月或秋季九月間選上年生組織充實枝條，於分枝基部交互刻傷一至二處，後以切開之竹筒盛以水苔培養土包裹，以細紮縛，經常澆水，保持濕度，四至五個月在刻傷處即發生不定根，去除竹筒切斷枝條，即成新株。 掘穴三十公分深，穴底施以腐熟堆肥或厩肥○五公升，上面覆土四

至五公分，後將苗置入，踏實使土與根密接後充分澆水，植後二至三年需注意澆水、中耕除草與施肥。

樹蘭可作茶種香料，在本省各大茶行均有收購，其價格的高低，除受本省品質影響外，尚與茉莉花有關。即茉莉花盛產時其價格低，反之茉莉花少時，其價格高，故波動很大，每公升自十元至三十元不等。樹蘭多用作燻製次等茶，故不若栽種茉莉及秀英有利。

樹蘭除供作製茶香料外，尚可曬乾作枕頭填充物，使枕頭芳香舒適。(呂淑濤) 註：桃園縣龜山楓樹中坑二十號卓阿木農友來信詢問樹蘭，請參考。

## 鬱金香

鬱金香是一種球根花卉，世界上以荷蘭栽培最廣。耐寒力強，喜冷涼氣候及富含腐植質而排水良好之壤土，可作盆栽及露地栽培。宜秋植，在本省因氣溫高，栽植前需將球根在攝氏十度左右溫度下，放置六至八週使之休眠以利開花。

鬱金香宜於十一月種植。盆栽需用特製培養土，露地栽植先深耕隔地二十公分，地整妥後，掘穴十五

公分深，穴底置腐熟堆肥兩把(重約三十公克)再覆土四、五公分，然後再將球植於土中，球之深度，以球頂端再蓋土二至三分為度。

露地栽植植株距二十五公分。生育期間再施二、三次稀薄豆餅水。翌春即可開花。五、六月開花後俟枝葉乾枯時，將母球及子球收貯，貯於乾燥冷涼處，以作秋季栽植之用，母球下年春仍可開花，子球需再培養一、二年始可開花。在本省栽培因氣溫高，多呈徒長現象，每一種球約值新台幣五、六元。(呂淑濤) 註：台北縣板橋深丘里東安九十三號陳仕英來信詢問鬱金香問題，請參考。

## 向日葵

一般栽培草木花卉所壤相似，以含有多量有機質並有充分日照之地為宜。以向日葵而言，雖任何土地皆可生育，但最好仍栽培在含機質多的粘質壤土，有充分日照和水分土地，乾燥地則生長不良。

向日葵用種子繁殖。台灣目前有專供觀賞用的瓜葉向日葵，以及觀賞、食用兼用的普通向日葵二種。

瓜葉向日葵，株高一至一·五公尺，花徑五至七·五公分。普通向日葵，株高一至三·五公尺，花徑七·五至三十公分。種子在中縣新社鄉農林廳種苗繁殖場有出售，每包三元。

向日葵種子含有多量之植物性脂肪，可採十五至二十%之向日葵油，以供食用。 以上兩種向日葵之植株都很高，不宜作盆栽。

向日葵的施肥和管理，可以參照玉米栽培方法，無需其他特別管理。

(黃敏展) 註：台北縣三芝國中周敏男先生來信詢問向日葵，請參考。

## 金線蓮

金線蓮是蘭科的一種，學名 Anoechilus Formosensis Hayata 屬台灣原生蘭花，花呈淡紅白色，莖面暗綠，葉背呈微紅色。

金蓮花在早春時開花，但不很香，市場上或私人園圃往往有人出售，除觀賞的用途外，據說還是一種藥用植物，可治肺及肝疾。

金線蓮以種子繁殖，栽培時需用排水良好的沙質壤土，最好用培養土。植後宜置於陰涼處培養，方可生育良好，開花美麗。(楊紹薄)

## 山梔

山梔(黃梔子)是香花植物，常綠小喬木，花梗短頂生，萼圓筒形，六至七裂，長一至二公分，花白色具芳香，原產我國，本省各地均適合栽培。

繁殖可用扦插法，每年春季選去年強健生長枝，剪成三十公分插穗扦插於培養土中，踏實，使土與枝條密接易於生根。一至二年後，於春季移植本圃。

黃梔子樹勢強健，粘土亦能生長，但以表土深厚土壤最宜生長，每遇春、秋二季，可施水肥以增進梔子生長發育，約一年後即可開花，但此時因樹齡小，花收量不多，嗣後每年均可增產直至壯年，七至八年應行培土，十七至二十年時應行更新。

梔子花具濃香，是茶種香料之一，每年五至六月開花，可供觀賞兼作香花。(范念慈)

註：台中市英士路十二巷七號劉慕農農友來信詢問黃梔子，請參考。