

【問】目前仍以合南五號玉米的第二或第三穗玉米吐出時採收利用，第一穗可留為飼料用。

【問】與合南五號玉米種法相同，只是當副產物，可以增加收益。

稻水

谷樂生浸稻種

可防稻苗徒長

【問】：(一)稻穀浸種後，播種出來的秧苗，爲何會有稻公產生？

【答】：(一)有何方法可避免或改善此種情形？(二)雲林縣林內鄉林中村三號仔一號張占賢

【問】：(一)所提秧公或稻公是一種病叫做稻馬廬苗病，或叫做稻苗徒長病。

【答】：(一)實行種子消毒可以改善此種情形，即用谷樂生(水銀劑三·六·多)，用水稀釋一千分之一，浸種二小時，後洗淨。(黃真生)

水稻二化螟防治法

【問】：我耕作水稻一甲左右，現已除二次草了，部份因病蟲害，非常嚴重，經噴用正豐松農藥及加保利效果很小，隨附標本，是何病，噴何藥？(恒春德和里德和路五號張恒祥)

【答】：水稻病株是受二化螟爲害，防治方法可任選左表藥劑一種防治：(林排瑞 瑞華)

藥劑名稱	幼株期	孕穗期	稀釋倍數	施藥次數
45%依必安乳粉劑	〇·八一	一·二一	一千倍	每十五天一次
3%7BHC粉劑	一·二公升	一·五公升	二十天一次	二十天一次
6%7BHC粒劑	五十公升	五十六公升		
3%速滅松粉劑	二十公升	二十五公升		
3%速滅松粉劑	三十一	四十四公升		每七天一次

稻田排水不良

易生胡麻葉枯病

【問】：(一)合南五號水稻，葉而呈小形褐色斑點每期都發生，是何病，如何防治？

【答】：(一)附上水稻土壤，請鑑定？

【問】：(一)擬大量施用鉀肥，每公頃施用量如何？(二)桃園縣觀音鄉新坡村七十五號謝金安

【答】：(一)稻葉是胡麻葉枯病，本病的發生常在氮肥缺乏的田間出現。土壤環境不良，肥料養份吸收困難或低濕地排水不良的場所，多有此現象，這些地方鉀肥與鉀肥很難被水稻吸收，故水稻多呈胡麻葉枯病，其對策可從改良土壤先着手，三要素肥料要適量配合爲要。

【問】：(一)據附來土壤經酸度檢定結果，其酸鹼度爲五，可謂酸性土壤，此土壤應以鈣質調整酸度。

【答】：(一)鉀肥用量，普通土壤約每公頃一千公

【問】：(一)木瓜園栽植三葉草是否合適，若不合適，有何類草可栽植？

【答】：(一)三葉草如何栽植？每公頃需苗量若干？(二)若要增加土地肥力，是否要將三葉草耕入土內？(高雄縣旗山鎮旗東路三十號黃瑞華)

【問】：(一)木瓜園中不適宜種植三葉草中之蠟蓋作物尚在試驗中，目前尚無適當覆蓋作物可種植。(二)本省由外國

持保土水

木瓜園覆蓋作物

目前尚在試驗中

【問】：(一)木瓜園栽植三葉草是否合適，若不合適，有何類草可栽植？

【答】：(一)三葉草如何栽植？每公頃需苗量若干？(二)若要增加土地肥力，是否要將三葉草耕入土內？(高雄縣旗山鎮旗東路三十號黃瑞華)

【問】：(一)木瓜園中不適宜種植三葉草中之蠟蓋作物尚在試驗中，目前尚無適當覆蓋作物可種植。(二)本省由外國

【問】：(一)木瓜園中不適宜種植三葉草中之蠟蓋作物尚在試驗中，目前尚無適當覆蓋作物可種植。(二)本省由外國

神奇藥效 鐵般的事實



石原農藥

原裝進口 普通供應

蕃茄多旺 トマトトーン

防止落果、增大果實、增加收成47%、減少畸形怪果。

根多旺 ルートーン

促進蔬菜種子，各種果樹，園藝作物之插苗、插木之發根。

石原 2,4-Dソーダ塩 除草劑

防止水稻倒伏·更能增收20%

(說明書備索)

總代理 大豐農藥股份有限公司

臺北市襄陽路13號3樓 電話：337858·334703

本秋季 日本 美國 等新種子已到齊

長岡 交配 天理 交配 日本 大和 農園 產品

大和一號甘藍

耐暑、耐寒、抗病力強、結球最快，50天以前可收穫，重量二斤半左右。耐暑、耐寒、抗病力強，60天可收，重量三斤以上，葉質柔軟可口。

金力甘藍

本品種系洋種菠菜與日本菠菜交配育成生產者一致公認，耐病耐寒生長快，可在八月至三、四月間隨時栽植，如同時播種比任何品種收穫產量數倍。

巨豐菠菜

交配種皮綠色，黑花紋肉鮮黃，每株十五粒以上，抗病力強，每粒重一·五公

小玉西瓜

甜王西瓜、新富士西瓜、ニユーメロ、甜瓜、金城甜瓜、秋季新到草花種子防濕繪袋原封數十種。

新裕興企業股份有限公司 新合成種子行

臺北市迪化街一段一四九號 臺灣郵政劃撥：502號 TEL: 543787

總代理 台灣